

O'zbekiston Respublikasi  
Sog'liqni saqlash vazirining  
2025 yil "23" iyundagi  
180-sonli buyrug'iga  
ilova

SHIFOXONAGA BOG'LIQ BO'LMAGAN ZOTILJAM NOZOLOGIYASI BO'YICHA TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH  
MILLIY KLINIK STANDARTI



**“TASDIQLAYMAN”**

**O‘zR SSV RIPIATM direktori**

**A.A. Abdukayumov**

**\_\_\_\_\_ 2025-yil**

**SHIFOXONADAN TASHQARI ZOTILJAM NOZOLOGIYASI BO‘YICHA TIBBIY XIZMAT**

**KO‘RSATISH MILLIY KLINIK STANDARTI**

**Toshkent 2025**

**SHIFOXONAGA BOG'LIQ BO'LMAGAN ZOTILJAM****(nozologiya nomi)****NOZOLOGIYASI BO'YICHA TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH MILLIY KLINIK STANDARTI****NOZOLOGIYA KLINISYENINING MILLIY STANDARTI, ETILADIGANNING DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH BO'YICHA MUTAXASSISI**

XKT-10/11 buyicha kodi:	Nozologik nomlanishi:	Nozologiya bo'yicha ambulatoriya sharoitida tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar		Nozologiya bo'yicha stasionar sharoitda tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar	
		Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo'shimcha jalb etiladigan mutaxassislar	Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo'shimcha jalb etiladigan mutaxassislar
J13	Streptococcus pneumoniae қўзғатган зотилжам	1. Osh 2. Pediatr	1.LOR 2. Kardiolog 3. Neyropotolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog	1.LOR 2. Kardiolog 3. Neyropotolog
J14	Haemophilus influenzae qo'zg'atgan zotiljam				
J15	Boshqa turkumlarda tasniflanmagan bakterial zotiljam				
J15.0	Klebsiella pneumoniae qo'zg'atgan zotiljam				
J15.1	Pseudomonas qo'zg'atgan zotiljam				
J15.2	Стафилококк qo'zg'atgan zotiljam				
J15.3	В гурӯҳи стрептококки qo'zg'atgan zotiljam				
J15.4	Boshqa streptokokklar qo'zg'atgan zotiljam				
J15.5	Escherichia coli qo'zg'atgan zotiljam				
J15.6	Boshqa aerob gram manfiy bakteriyalar qo'zg'atgan zotiljam				

J15.7	Mycoplasma pneumoniae				
J15.8	Boshqa bakterial zotiljamlar				
J15.9	Аниқланмаган бактериал зотилжам				
J16	Boshqa turkumlarda tasniflanmagan boshqa yuqumli omillardan kelib chiqqan zotiljam				
J16.0	Xlamidiyalar qo'zg'atgan zotiljam				
J16.8	Boshqa aniqlangan yuqumli omillar qo'zg'atgan zotiljam				
J17	Boshqa turkumlarda tasniflangan kasalliklardagi zotiljam				
J17.0	Boshqa turkumlarda tasniflangan kasalliklardagi zotiljam				
J17.1	Boshqa turkumlarda tasniflangan kasalliklardagi zotiljam				
J17.3	Микозларда зотилжам				
J17.8	Parazitar kasalliklarda zotiljam				
J18	Boshqa turkumlarda tasniflangan kasalliklardagi zotiljam				
J18.0	Qo'zg'atuvchisi aniqlanmagan zotiljam				
J18.1	Aniqlanmagan bronxozotiljam				
J18.2	Aniqlanmagan bronxozotiljam				
J18.8	Aniqlanmagan gipostatik zotiljam				
J18.9	Qo'zg'atuvchisi aniqlanmagan boshqa zotiljam				
CA40. 05 Pseudomonas aeruginosa sabab bo'lgan pnevmoniya CA40-CA4Z o'pka infeksiyalari CA40. 04 Mycoplasma pneumoniae sabab bo'lgan pnevmoniyasi CA40.1Y boshqa belgilangan virus sabab bo'lgan pnevmoniya CA40.1Z aniqlanmagan virusli pnevmoniya CA40. 1 virusli pnevmoniya CA40. 08 Beta-gemolitik streptokokk sabab bo'lgan pnevmoniya CA40. 2 Y boshqa belgilangan zamburug'li pnevmoniya					

CA40. 2 zamburug'li pnevmoniya CA0. 2Z aniqlanmagan zamburug'li pnevmoniya CA40. 20 pnevmosista sabab bo'lgan pnevmoniya CA40.03 Klebsiella pneumoniae sabab bo'lgan pnevmoniya CA40. 00 Chlamydophila pneumoniae sabab bo'lgan pnevmoniya CA40. 0 bakterial pnevmoniya CA40. 0Y boshqa belgilangan bakteriya sabab bo'lgan pnevmoniya CA40. 0Z aniqlanmagan bakterial pnevmoniya CA40. 01 Escherichia coli sabab bo'lgan pnevmoniya CA40. 02 Haemophilus influenzae sabab bo'lgan pnevmoniya CA40. 07 Streptococcus pneumoniae sabab bo'lgan pnevmoniya CA40. 06 Staphylococcus aureus sabab bo'lgan pnevmoniya CA40. 13 inson metapnevovirusidan CA 40.12 paragripp virusi sabab bo'lgan pnevmoniya CA40. 10 adenovirus sabab bo'lgan pnevmoniya Ca40. 11 respirator sintisial virusi sabab bo'lgan pnevmoniya CA40.Y boshqa aniqlangan pnevmoniya CA40. Z mikroorganizm aniqlanmagan pnevmoniya				
---	--	--	--	--

**SHIFOXONAGA BOG'LIO BO'LMAGAN ZOTILJAM NOZOLOGIYA BO'YICHA REJALI TASHXISLASH, DAVOLASH, REABILITASIYA VA DISPANSERIZASIYA TADBIRLARI**

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSH/OP	KTMP	Tuman (shahar shifoxonalari)	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
<b>Asosiy mutaxassis (shifokor) maslahati</b>	Shikoyati va anamnez (kasallik va hayot anamnezi)	1. OSH 2. Pediatr 3. Pulmonolog	1 OSH 2. Pediatr 3. Pulmonolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3.LOR 4. Kardiolog 5. Nevropatolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3.LOR 4. Kardiolog 5. Nevropatolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3.LOR 4. Kardiolog 5. Nevropatolog	Tibbiy kurik davida yilda kamida 1 marta; <input type="checkbox"/> Kasallik bo'yicha murojaat bo'lganida 1 marta va ko'rsatma bo'lganida	- Kasallik bo'yicha murojaat bo'lganida 1 marta va ko'rsatma bo'lganida to'liq ko'ruvni o'tkazadi
	Ob'ektiv ko'rik	1. OSH 2. Pediatr 3. Pulmonolog	1 OSH 2. Pediatr 3. Pulmonolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3.LOR 4. Kardiolog 5. Nevropatolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3.LOR 4. Kardiolog 5. Nevropatolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3.LOR 4. Kardiolog 5. Nevropatolog	Tibbiy kurik davida yilda kamida 1 marta; <input type="checkbox"/> Kasallik bo'yicha murojaat bo'lganida 1 marta va ko'rsatma bo'lganida	- Kasallik bo'yicha murojaat bo'lganida 1 marta va ko'rsatma bo'lganida to'liq ko'ruvni o'tkazadi
	Fizikal va klinik tekshiruv	1. OSH 2. Pediatr 3. Pulmonolog	1 OSH 2. Pediatr 3. Pulmonolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3.LOR 4. Kardiolog 5. Nevropatolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3.LOR 4. Kardiolog 5. Nevropatolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3.LOR 4. Kardiolog 5. Nevropatolog	Tibbiy kurik davida yilda kamida 1 marta; <input type="checkbox"/> Kasallik bo'yicha murojaat bo'lganida 1 marta va	- Kasallik bo'yicha murojaat bo'lganida 1 marta va ko'rsatma bo'lganida to'liq ko'ruvni

							ko'rsatma bo'lganida	o'tkazadi
<b>Izoh:</b>								
<b>Mutaxassis (shifokor) maslahati (qo'shimcha)</b>	<b>1. Tibbiy ko'rik (havf omillarini aniqlash)</b>			1. Pediatr 2. Pulmonolog 3.LOR 4. Kardiolog 5. Nevropatolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3.LOR 4. Kardiolog 5. Nevropatolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3.LOR 4. Kardiolog 5. Nevropatolog	– 1-5 yoshdagi bolalar yilda 2 marta;(bola – 5 yoshdan kattalar bolalar yilda 1 marta	Davolash xodoriyasi: sinishi indeksi: 3-5 kuna; Susayish koeffitsienti: susayish holati - Muayyan omillarni hal qilish; - davolash kasalxonasi tavsiya etiladi beriladi; -shifokor tavsiyasi bilan ambulatoriya kuzatuvi.
	<b>2. Havf omillarini bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar</b>			1. Pediatr 2. Pulmonolog 3.LOR 4. Kardiolog 5. Nevropatolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3.LOR 4. Kardiolog 5. Nevropatolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3.LOR 4. Kardiolog 5. Nevropatolog		Davolash davomiyligi: havf omili aniqlanmagan da: 3-5 kun; havf omili aniqlanganda : holati yaxshilangunga qadar - murojaat qilganda havf omilini aniqlash; - stasionarda davolash

								tavsiyasi beriladi; - shifoxonadan chiqishda ambulator nazorat uchun tavsiyalar beriladi.
	...							

**Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq) bemorda qo'shimcha boshqa yoki yondosh kasalliklari aniqlangan holatda, ko'rsatmaga muvofiq Milliy klinik protokollarda keltirilgan boshqa tegishli tor doirasidagi mutaxassislarning ko'rigi o'tkazilishi talab etiladi;**

- kasallikni asoratlangan holatida murojaat bo'lsa va/yoki aniqlansa, shuningdek jarrohlik amaliyotiga ko'rsatma bo'lgan holatlarda shoshilinch jarrox konsultatsiyasi o'tkaziladi, bemor holatiga qarab shifoxonaga stasionar davoga va/yoki jarroxlik amaliyotini o'tkazish uchun yo'naltiriladi.

<b>Asosiy laborator tekshiruvlar</b>	<b>Asosiy:</b> 1. Qonning umumiy (klinik) taxlili	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		Kasallik bo'yicha murojaat bo'lganida 1 marta va/yoki ko'rsatmaga muvofiq
	2. Siydikning umumiy (klinik) tahlili	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		
	3. Balgamning bakteriologik ekmasi	qo'llanilmaydi	Kullaniladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		
	4. Bioximik kon taxlili, S reaktiv oksili va prokaltsi-Tonin, koagulogramma aniqlash uchun tekshiruv	Kullaniladi	Kullaniladi	Kullaniladi	Kullaniladi	Kullaniladi		

**Izoh:** birlamchi murojaat qilingan shifokor tomonidan laborator tekshiruvlarni o'tkazilishi talab etiladi, keyingi darajaga tor mutaxassislar ko'ruviga shu taxlillar natijalari yo'naltiriladi. Laborator tekshiruvni takroriy o'tkazilishi, tor mutaxassis yoki stasionar davolanish jarayonida ko'rsatma bo'lganidagina o'tkaziladi.

<b>Qo'shimcha laborator tekshiruvlar</b>	<b>Qo'shimcha:</b> Bemorni konsultasiya qilishda yondosh kasalliklari aniqlanganda, tibbiyot muassasalari darajasidan kelib chiqib mavjud laborator tekshiruvlari o'tkaziladi.							
	<b>Ichak mikrobiotasini tekshirish</b>	qo'llanilmaydi	qo'llanilmaydi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		

	...							
<b>Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)</b>								
<b>Asosiy instrumental tekshiruvlar</b>	<b>1. Asosiy:</b> 1. kukrak kafasi rentgen. Kursatmaga kura MSKT	qo'llanilmaydi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		- Kasallik bo'yicha murojaat bo'lganida 1 marta va/yoki ko'rsatmaga muvofiq
<b>Izoh:</b> instrumental diagnostik tekshiruvlar birlamchi murojaat qilingan shifokor tomonidan o'tkaziladi. Agarda, boshqa darajadagi tibbiyot muassasasida davolanishga ko'rsatma paydo bo'lsa, shu o'tkazilgan tekshiruv nusxalari bilan yo'naltiriladi. Instrumental diagnostik tekshiruvni takroriy o'tkazilishi, tor mutaxassis yoki stasionar davolanish jarayonida ko'rsatma bo'lganidagina o'tkaziladi.								
<b>Qo'shimcha instrumental tekshiruvlar</b>	<b>1.</b> Bemorni konsultasiya qilishda yondosh kasalliklari aniqlanganda, tibbiyot muassasalari darajasidan kelib chiqib mavjud instrumental diagnostik tekshiruvlari o'tkaziladi.							
	<b>2.</b> EKG	qo'llanilmaydi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		
	<b>3.</b> Qorin bo'shlig'i a'zolari UTT	qo'llanilmaydi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		
<b>Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)</b>								
<b>*Stasionar davoga ko'rsatma: (bu erga ambulator davo jarayonida paydo bo'ladigan stasionar davoga ko'rsatmalar yoziladi)</b>								

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSH/OP	KTMP	OSH/OP	KTMP	OSH/OP		
Boshqa turdagi tekshiruvlar	1.							
	2.							
	...							

Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)

(MEDIKAMENTOZ DAVO)

Davolash tadbirlari (asosiy medikamentoz davo)			Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
			Ambulator yordam		Stasionar yordam				
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi		OSH/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalar i	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Amino-penitsillin	Amoksitsillin	ichishga, kuniga 45-90 mg / kg, 2-3 mart/kun	+	+	-	-	-	45-90 mg / kg / kun, 2-3 mart / sud	2 up
	Amoksitsillin / klavulanat	ichishga, kuniga 45-90 mg / kg, 2-3 mart/kun	+	+	-	-	-	45-90 mg / kg / kun, 2-3 mart / sud	2 up
	Amoksisillin / sulbaktam	ichishga, 45-90 mg/kg/sut, 2-3 marta/sut	+	+	-	-	-	45-90 mg / kg / kun, 2-3 mart / sud	2 up
	Sultamisillin	ichishga, 25-50 mg/kg/sut, 2-3 marta/sut	+	+	-	-	-	25-50 mg/kg/sut, 2-3 marta/sut	2 up
	Benzilpenitsillin	V/i, m / o, 100000-500000 u / kg / kun,	-	-	+	+	+	V/ i, m / o, 100000-500000 u / kg / kun, 4-6 Mar / kun	14fl

		4-6 Mar/kun							
	Ampisillin	V/i, m/o, 100-200 mg/kg/sut, 4 Mar/sut	-	-	+	+	+	V/i, m/o, 100-200 mg/kg/sut, 4 Mar/sut	14fl
	Oksasillin	V/i, m/o 150-300 mg/kg/sut, 4-6 Mar/sut	-	-	+	+	+	V/i, m/o 150-300 mg/kg/sut, 4-6 Mar/sut	14fl
	Amoksisillin/ klavulanat	V/i, m/o, 3 oylikdan - 60 mg/kg (kg <4 kg) yoki 90 mg/kg (vazn > 4 kg), keyin 3 oy , 3-4 Mar/sut -	-	-	+	+	+	V/i, m/o, 3 oylikdan - 60 mg/kg (kg <4 kg) yoki 90 mg/kg (vazn > 4 kg), keyin 3 oy , 3-4 Mar/sut -	14fl
	Amoksisillin/ sulbaktam	V/i, m/o, 2 yoshgacha – 40-60 mg/kg/sut, 2-6 yosh – 750 mg, 6-12 yosh – 1,5 g, 12 yoshdan keyin – 2-3 g, 2-3 Mar/sut	-	-	+	+	+	V/i, m/o, 2 yoshgacha – 40-60 mg/kg/sut, 2-6 yosh – 750 mg, 6-12 yosh – 1,5 g, 12 yoshdan keyin – 2-3 g, , 2-3 Mar/sut	14fl
	Ampisillin/ sulbaktam	V/i, m/o 150 mg/kg/sut, 3-4 Mar/sut	-	-	+	+	+	V/i, m/o 150 mg/kg/sut, 3-4 Mar/sut	14fl
Tsefalosporin -2	Tsefuroksim ichishga,	20-30 mg/kg (500 mg/sut, 2 marta /sud ko'rsatmaga ko'ra	+	+	-	-	-	ichishga, 20-30 mg/kg (500 mg/sut, 2 marta /sud ko'rsatmaga kora	2 fl
	Tsefaklor	ichishga, 20-40 mg/kg (1500 mg/sutki p bo'lmagan, 2-3 marta /sud ko'rsatmaga kira	+	+	+	+	+	ichishga, 20-40 mg/kg (1500 mg/sutkup bo'lmagan, 2-3 marta /sut ko'rsatmaga ko'ra	2 fl
	Tsefuroksim	V/i, m/o 30-100 mg/kg/sut, 2 marta /sut	-	-	+	+	+	V/i, m/o 30-100 mg/kg/sut, 2 marta/sut	14fl

Tsefalosporin -3	Tsefotaksim	Tsefotaksim V/i, m/o 50-100 mg/kg/sut, 2 marta /sut	-	-	+	+	+	V/i, m/o 50-100 mg/kg/sut, 2 Mar/sut 14fl	14fl
	Tseftriakson V	V/i, m/o 20-80 mg/kg /sut, 1-2 Mar/sut	-	-	+	+	+	V/i, m/o 20-80 mg/kg /sut, 1- 2 Mar/sut	14fl
	Tseftazidim	V/i, m/o 30-150 mg/kg (6 g kep emes), 2 oylikkacha - 25-60 mg/kg/sut, 2 m/sut	-	-	+	+	+	V/i, m/o 30-150 mg/kg (6 g ko'p emas), 2 oylikgacha - 25-60 mg/kg/sut, 2 m/sut	14fl
	Tsefoperazon V/i, m/o 50- 200 mg/kg/sut, 2m/sut	V/i, m/o 50-200 mg/kg/sut, 2m/sut	-	-	+	+	+	V/i, m/o 50-200 mg/kg/sut, 2 m/sut	14fl
IZTSS-3	Tsefoperazon/ sulbaktam	V/i, m/o 40-160 mg/kg/sut, 2 m/sut	-	-	+	+	+	V/i, m/o 40-160 mg/kg/sut, 2m/sut	14fl
	Tsefotaksim/s sulbaktam	V/i, m/o 100-160 mg/kg/sut, 2 marta	-	-	+	+	+	V/i, m/o 100-160 mg/kg/sut, 2 marta	14 fl
SS-4	Cefepim	V/i, m/o 100-150 mg/kg / kun, 2 mart	-	-	+	+	+	V/i, m/o 100-150 mg/kg/sut, 2 marta 14 fl	14 fl
IZTSS-4	Tsefepim/ sulbaktam	V/i, m/o 100-150 mg/kg (tsefipimga) /sut, 2 marta	-	-	+	+	+	V/i, m/o 100-150 mg /kg (sefipimga) / sud, 2 mart 14 fl	14 fl
Karbapenem	Imipenem	V/i, m/o V/i - 60 mg/kg, m\o – 1-1,5 g/sut, 3 mart	-	-	+	+	+	V/i, m/o V/i - 60 mg/kg, m\o – 1-1,5 g/sut, 3 mart	30 fl
	Meropenem	V/i, 30-60 mg/kg/sut, 2-3 marta/sut, 2-3 marta	-	-	+	+	+	V/i, 30-60 mg/kg/sut, 2-3 marta/sut, 2-3 marta	30fl

	Ertapenem	V/i, m/o 30 mg/kg (1 g dan kap )	-	-	+	+	+	V/i, m/o 30 mg/kg (1 g dan kap )	30 fl
Aminoglikozid	Amikasin	V/i, m/o 10-20 mg/kg/sut, 1-2 marta	-	-	+	+	+	V/i, m/o 10-20 mg/kg/sut, 1-2 marta	14fl
	Gentamitsin	B/i, m/o 3-5 mg/kg / kun, 1-2 marta	-	-	+	+	+	V/i, m/o 3-5 mg/kg/sut, 1-2 raza	14fl
	Netilmisin	V/i, m/o 4-6,5 mg/kg/sut, 1-2 raza	-	-	+	+	+	V/i, m/o 4-6,5 mg/kg/sut, 1-2 raza	14fl
	Tobramisin	V/i, m/o 3-5 mg/kg/sut, 1-2 Raza	-	-	+	+	+	V/i, m/o 3-5 mg/kg/sut, 1-2 raza	14 fl
Makrolidlar	Azitromisin	ichishga, 10 mg/kg/sut, sutkada 1 marta	+	+	-	-	-	ichishga, 10 mg/kg/sut, sutkada 1 marta	1 up
	Azitromisin	V/i, 10 mg/kg (500mg dan kap mas)* /sut, 1 marta	-	-	+	+	+	V/i, 10 mg/kg (500mg dan kap mas)* /sut, 1 marta	7 fl
	Klaritromisin (Klasid)	ichishga, 15 mg/kg/sut (500 mg dan kam emas) , 1-2 marta/sud	+	+	+	+	+	ichishga, 15 mg/kg/sut (500 mg dan kam emas) , 1-2 marta/sud	1up
	Roksitromisin	ichishga, 5-8 mg/kg/sut (300 mg kap emas), 2 marta/sud	+	+	+	+	+	ichishga, 5-8 mg/kg/sut (300 mg kap emos), 2 marta/sud	1up
	Djozamisin	Djozamisin	-	-	+	+	+	ichishga, 40-50 mg/kg/sut, 2-3 mart /sut	1up

	Midekamisin	ichishga, 20-50 mg/kg/sut, 2-3 marta/sut	-	-	+	+	+	ichishga, 20-50 mg/kg/sut, 2-3 marta/sud	1up
	Spiramisin	ichishga, 150000-300000 me/kg/sut, 2-3 Mar /sut	-	-	+	+	+	ichishga, 150000-300000 me/kg/sut, 2-3 Mar /sut	1up
	Klindamisin	ichishga, 8-25 mg/kg/sut, 2-3 mart /sut	-	-	+	+	+	ichishga, 8-25 mg/kg/sut, 2-3 mart /sut	1up
Linkozamid	Linkomitsin	V/i, m/o 10-20 mg/kg / kun, 2 marta	-	-	+	+	+	V/i, m/o 10-20 mg/kg/sut, 2 mart	14fl
	Klindamisin	V/i, m/o 20-40 mg/kg/sut,3-4 mart	-	-	+	+	+	V/i, m/o 20-40 mg/kg/sut,3-4 mart	14fl
Boshqa antibiotik J01 XX01	Fosfomitsinno	V/i 100-200 mg/kg./sut, 1-2 mart	-	-	+	+	+	V/i 100-200 mg/kg./sut, 1-2 mart	14fl
Glikopeptid A07AA09	Vankomisin	V/i, 40 mg/kg/sut, 3 mart	-	-	+	+	+	V/i, 40 mg/kg/sut, 3 mart	21fl
Oksazolidinon J01XX08	Linezolid	V/i, 20 mg/kg/sut, 2-mart	-	-	+	+	+	V/i, 20 mg/kg/sut, 2-mart	14fl
β2-Агонист	Fenoterol	0,5–0,75 mg	-	-	+	+	+	0,5–0,75 mg (10-15 tomshi)	1fl
	Salbutamol (Nebutamol)	1-2,5 mg (1-2,5 ml)	-	-	+	+	+	1-2,5 mg (1-2,5 ml)	1fl
Antikolinerjik	Ipratropiumbromid (atrovent)	Sprey 0,25 mg (1 ml)	-	-	+	+	+	0,25 mg (1 ml)	1fl

Steroid	Beklometazon di-propionat (beklazon)	Sprey 400-800 mkg/sut	-	-	+	+	+	400–800 мкг/сут	1fl
	Budesonid (pulmikort, benakort)	Ingalyasiya 400-800 mkg/sut	-	-	+	+	+	400–800 мкг/сут	14fl
	флутиказонапропионат(небуфлюзон)	Ингаляция 1 мг в/сут	-	-	+	+	+	1 мг в/сут	14fl
Virusli infeksiya	rekombinantlangan odam interferon alfa-2b	Rektal 7 yoshdan katta bolalarga, -500000 me 1 supp. Dan. 2 marta sutkada 12soatda 5 kun xar kuni. 7 yoshgacha bolalarga, 150000 me 1 supp. Dan. 2 marta sutkada 12soatda 5 kun xar kuni.	+	+	-	-	-	Rektal 7 yoshdan katta bolalarga, -500000 me 1 supp <sup>2</sup> up Dan. 2 marta sutkada 12soatda 5 kun xar kuni. 7 yoshgacha bolalarga, 150000 me 1 supp. Dan. 2 marta sutkada 12soatda 5 kun xar kuni.	
Virusga qarshi preparat L03AB05	interferon gammaga antitela, CD 4 ga antitela, gistaminga antitela	1 oylik va undan kattayoshdagi bolalar. Davolashning 1-kunida quyidagi sxema bo'yicha 8 tabletkadan oling: Birinchi 2 soatda har 30 daqiqada 1 tabletkadan (2 soat ichida jami 5 tabletka), so'ngra	+	+	-	-	-	1 oylik va undan katta yoshdagi bolalar. Davolashning 1-kunida quyidagi sxema bo'yicha 8 tabletkadan oling: Birinchi 2 soatda har 30 daqiqada 1 tabletkadan (2 soat ichida jami 5 tabletka), so'ngra o'sha kun davomida yana 1 tabletkadan 3 marta teng vaqt oralig'ida oling. 2-	2 up

		o'sha kun davomida yana 1 tabletkadan 3 marta teng vaqt oralig'ida oling. 2-kuni va undan keyin to'liq tiklanishigacha kuniga 3 marta 1 tabletkadan oling.						kuni va undan keyin to'liq tiklanishigacha kuniga 3 marta 1 tabletkadan oling.	
Virusga qarshi preparat J05AB11	Valasiklovir	Bolalarga ½ tabletkadan kuniga 2 mahal. - Varicella Zoster virusi keltirib chiqaradigan zoster uchug'i va suvchechak; - Herpes Simplex virusi keltirib chiqaradigan teri va shilliq pardalarning infeksiyalari (1 va 2 turdagi) - tsitomegalovirus (SMV) infeksiyasining ko'payishini kamaytirish uchun.	+	+	+	+	+	Bolalarga ½ tabletkadan kuniga 2 mahal. - Varicella Zoster virusi keltirib chiqaradigan zoster uchug'i va suvchechak; - Herpes Simplex virusi keltirib chiqaradigan teri va shilliq pardalarning infeksiyalari (1 va 2 turdagi) - tsitomegalovirus (SMV) infeksiyasining ko'payishini kamaytirish uchun.	1 up
Virusga qarshi preparat L03	aminodigidroftalazindion natriя	Rektal: 1 yosh va undan katta bolalar uchun, 1 ta shamchadan har kuni 5 kun, keyin 1 ta shamchadan har kuni 10 kun davomida. Kurs - 15 ta shamcha	+	+	+	+	+	Rektal: 1 yosh va undan katta bolalar uchun, 1 ta shamchadan har kuni 5 kun, keyin 1 ta shamchadan har kuni 10 kun davomida. Kurs - 15 ta shamcha. Til ostiga tabletkalar. 1 tabletkadan sutkasiga 4	2 up

		Til ostiga tabletkalar. 1 tabletkadan sutkasiga 4 mahalgacha yoki 2 ta tabletkadan sutkasiga 2 mahal 5 kun.						mahalgacha yoki 2 ta tabletkadan sutkasiga 2 mahal 5 kun.	
Virusga qarshi preparat	Azoksimera bromid	Parenteral yuborish uchun eritmalar tayyorlash (mushak ichiga va tomir ichiga): Mushak ichiga yuborish uchun 3 mg preparat 1 ml (2 ml ga 6 mg doza) in'ektsiya uchun suvda yoki 0,9% natriy xlorid eritmasida eritiladi. Solventni qo'shgandan so'ng, preparat shishishi uchun 2-3 daqiqaga qoldiriladi, keyin silkitmasdan aylanish harakatlari bilan aralashtiriladi. Vena ichiga tomchilab yuborish uchun preparat 2 ml steril 0,9% natriy xlorid eritmasida eritiladi. Solventni qo'shgandan so'ng, preparat shishishi uchun 2-3 daqiqaga	+	+	+	+	+	Parenteral yuborish uchun eritmalar tayyorlash (mushak ichiga va tomir ichiga): Mushak ichiga yuborish uchun 3 mg preparat 1 ml (2 ml ga 6 mg doza) in'ektsiya uchun suvda yoki 0,9% natriy xlorid eritmasida eritiladi. Solventni qo'shgandan so'ng, preparat shishishi uchun 2-3 daqiqaga qoldiriladi, keyin silkitmasdan aylanish harakatlari bilan aralashtiriladi. Vena ichiga tomchilab yuborish uchun preparat 2 ml steril 0,9% natriy xlorid eritmasida eritiladi. Solventni qo'shgandan so'ng, preparat shishishi uchun 2-3 daqiqaga qoldiriladi, keyin aylanish harakatlari bilan aralashtiriladi. Bemor uchun hisoblangan doza steril tarzda 0,9% natriy xlorid eritmasi bo'lgan shisha / sumkaga o'tkaziladi. Intranazal va sublingual	2 up

		<p>qoldiriladi, keyin aylanish harakatlari bilan aralashtiriladi. Bemor uchun hisoblangan doza steril tarzda 0,9% natriy xlorid eritmasi bo'lgan shisha / sumkaga o'tkaziladi. Intranazal va sublingual foydalanish uchun eritma tayyorlash: bolalar uchun 3 mg dozasi 1,0 ml (20 tomchi), 6 mg dozasi 2,0 ml (40 tomchi) (bir tomchi (0,05 ml)) eritiladi. tayyorlangan eritmada 0,15 mg preparat mavjud).</p>						<p>foydalanish uchun eritma tayyorlash: bolalar uchun 3 mg dozasi 1,0 ml (20 tomchi), 6 mg dozasi 2,0 ml (40 tomchi) (bir tomchi (0,05 ml)) eritiladi. tayyorlangan eritmada 0,15 mg preparat mavjud).</p>	
Odam IgG	Pentaglobin	Kam vazndagi tug'ilganda bolalar nizkoy Massoy tela pri rojenii - 0.5-1 g/kg interval bilan 1-2 xaf.	-	-	+	+	+	Kam vazndagi tug'ilganda bolalar nizkoy Massoy tela pri rojenii - 0.5-1 g/kg interval bilan 1-2 xaf.	5fl
Kombinirlangan preparat	Berodual (berotek/atrov ent	1 ml = 20 kapel	-	-	+	+	+	1 ml = 20 Kapel	1up
Sekretolitik	0,9% rastvor	2 ml 2 marta kunda	-	-	+	+	+	2 ml 2 marta kunda	2up

	NaCl	2 ml 2 marta kunda	-	-	+	+	+	2 ml 2 marta kunda	2up
	Gianeб 7% (gialuronat natriya 1mg+natriy xlorid 70 mg)	2 marta kunda						2 marta kunda	5 up
Mukolitik preparatlar	Asetilsistein (ACC)	Og'iz orqali kuniga 2 marta 100 mg yoki kuniga 2 marta 10 ml sirop (kuniga 400-600 mg atsetilsistein). 6 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar: 1 eruvchan tabletka. 100 mg dan kuniga 3 marta yoki 2 eruvchan tabletka kuniga 2 marta, 2 yoshdan bolalar.	+	+	-	-	-	Og'iz orqali kuniga 2 marta 100 mg yoki kuniga 2 marta 10 ml sirop (kuniga 400-600 mg atsetilsistein). 6 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar: 1 eruvchan tabletka. 100 mg dan kuniga 3 marta yoki 2 eruvchan tabletka kuniga 2 marta, 2 yoshdan bolalar.	2 up
	Ambroksol	og'iz orqali, 5 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar: 2 bo'lingan dozada kuniga 30-45 mg. 2 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar: 3 bo'lingan dozada kuniga 22,5 mg. 2 yoshgacha bo'lgan bolalar: kuniga 15 mg 2 dozaga bo'lingan.	+	+	-	-	-	Og'iz orqali, 5 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar: 2 bo'lingan dozada kuniga 30-45 mg. 2 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar: 3 bo'lingan dozada kuniga 22,5 mg. 2 yoshgacha bo'lgan bolalar: kuniga 15 mg 2 dozaga bo'lingan.	1 up
	Atsetilsistein	Ingalyasiya 2-3 ml	-	-	+	+	+	Ingalyasiya 2-3 ml	2up

Ambroksol	2 marta kunda	-	-	+	+	+	2 marta kunda	14 amp
Standartlangan quruq pechak ekstrakti (5-7,5:1) EA 575 (prospan)	Og'iz orqali sirop 7 mg / ml: 1 yoshdan - kuniga 2 marta 2,5 ml, 1 yoshdan 6 yoshgacha - kuniga 3 marta 2,5 ml, 6 yoshdan 10 yoshgacha - kuniga 3 marta 5 ml. 20 mg/ml tomchi: 1 yoshdan 4 yoshgacha - kuniga 3 marta 12 tomchi, 4 yoshdan 10 yoshgacha - kuniga 3 marta 16 tomchi, 10 va undan katta yoshdagilar - kuniga 3 marta 24 tomchi. 65 mg tabletkalar: 6 yoshdan 12 yoshgacha - ½ tabletka. Kuniga 2 marta, 12 yoshdan oshgan bolalar - 1 tabletka. ertalab va ½ Tab. Kechqurun. 35 mg paketlardagi eritma: 12 yoshdan oshgan bolalar, 1 paket. Kuniga 3 marta, 6 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan	+	+	+	+	+	Og'iz orqali sirop 7 mg / ml: 0 yoshdan 1 yoshgacha - kuniga 2 marta 2,5 ml, 1 yoshdan 6 yoshgacha - kuniga 3 marta 2,5 ml, 6 yoshdan 10 yoshgacha - kuniga 3 marta 5 ml. 20 mg/ml tomchi: 1 yoshdan 4 yoshgacha - kuniga 3 marta 12 tomchi, 4 yoshdan 10 yoshgacha - kuniga 3 marta 16 tomchi, 10 va undan katta yoshdagilar - kuniga 3 marta 24 tomchi. 65 mg tabletkalar: 6 yoshdan 12 yoshgacha - ½ tabletka. Kuniga 2 marta, 12 yoshdan oshgan bolalar - 1 tabletka. ertalab va ½ Tab. Kechqurun. 35 mg paketlardagi eritma: 12 yoshdan oshgan bolalar, 1 paket. Kuniga 3 marta, 6 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalar 1 paketdan kuniga 2 marta.	2 fl

	bolalar 1 paketdan kuniga 2 marta.							
Butamirat+ Gvanfenezin	Ichkarida, 7 kg gacha, kuniga 3-4 marta 8 tomchi, - 7-12 kg, kuniga 3-4 marta 9 tomchi, - 12-20 kg, kuniga 3 marta 14 tomchi, - 20-30 kg, kuniga 3-4 marta 14 tomchi, - 30-40 kg, kuniga 3-4 marta 16 tomchi, - 40-50 kg, kuniga 3 marta 25 tomchi, - 50-70 kg, kuniga 3 marta 30 tomchi, - 70 kg dan ortiq, kuniga 3 marta 40 tomchi	+	+	-	-	-	Ichkarida, 7 kg gacha, kuniga 3-4 marta 8 tomchi, - 7-12 kg, kuniga 3-4 marta 9 tomchi, - 12-20 kg, kuniga 3 marta 14 tomchi, - 20-30 kg, kuniga 3-4 marta 14 tomchi, - 30-40 kg, kuniga 3-4 marta 16 tomchi, - 40-50 kg, kuniga 3 marta 25 tomchi, - 50-70 kg, kuniga 3 marta 30 tomchi, - 70 kg dan ortiq, kuniga 3 marta 40 tomchi	2fl
Gvanfenezin+ salbutamol+br omgeksin	3 yoshdan ichishga x 3 maxal (5ml); 6 yoshdan ichishga ½ -1 Tab.x3maxal						3 yoshdan ichishga x 3 maxal (5ml); 6 yoshdan ichishga ½ -1 Tab.x3maxal	1up
bradikininga, gistaminga, morfinga antitelal, tozalangan	3 mart katta bolalar kuniga 3 mart foidalanadiganlarning 1-2 choy qoshig'i. 3 mart kuni kuniga tashrif buyurganingizdan so'ng, olinga 1-2 tabletkasi. (Tolik eriguncha uni	+	+	+	+	+	3 yoshdan katta bolalar kuniga 3 marta 1-2 choy qoshiqdan foydalanadilar. Ovqatdan tashqari kuniga 3 marta 1-2 tabletkadan oling. (to'liq eriguncha og'izda saqlang).	2up, 2fl

		quchoqlaydi.)							
	Timyan o'ti (Thymiherba), pechak barglari (Hederaefolium)	Og'iz orqali sirop 7 mg / ml: 0 yoshdan 1 yoshgacha - kuniga 2 marta 2,5 ml, 1 yoshdan 6 yoshgacha - kuniga 3 marta 2,5 ml, 6 yoshdan 10 yoshgacha - kuniga 3 marta 5 ml. 20 mg/ml tomchi: 1 yoshdan 4 yoshgacha - kuniga 3 marta 12 tomchi, 4 yoshdan 10 yoshgacha - kuniga 3 marta 16 tomchi, 10 va undan katta yoshdagilar - kuniga 3 marta 24 tomchi. 65 mg tabletkalar: 6 yoshdan 12 yoshgacha - ½ tabletka. Kuniga 2 marta, 12 yoshdan oshgan bolalar - 1 tabletka. ertalab va ½ Tab. Kechqurun. 35 mg paketlardagi eritma: 12 yoshdan oshgan bolalar, 1 sashe-paket. Kuniga 3 marta, 6 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalar 1	+	+	-	-	-	Og'iz orqali sirop 7 mg / ml: 0 yoshdan 1 yoshgacha - kuniga 2 marta 2,5 ml, 1 yoshdan 6 yoshgacha - kuniga 3 marta 2,5 ml, 6 yoshdan 10 yoshgacha - kuniga 3 marta 5 ml. 20 mg/ml tomchi: 1 yoshdan 4 yoshgacha - kuniga 3 marta 12 tomchi, 4 yoshdan 10 yoshgacha - kuniga 3 marta 16 tomchi, 10 va undan katta yoshdagilar - kuniga 3 marta 24 tomchi. 65 mg tabletkalar: 6 yoshdan 12 yoshgacha - ½ tabletka. Kuniga 2 marta, 12 yoshdan oshgan bolalar - 1 tabletka. ertalab va ½ Tab. Kechqurun. 35 mg paketlardagi eritma: 12 yoshdan oshgan bolalar, 1 sashe-paket. Kuniga 3 marta, 6 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalar 1 sashe-paketdan kuniga 2 marta	2up

		sashe-paketdan kuniga 2 marta						
--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

**Izoh: \*shifoxonaga bog'lik bo'lmagan zotiljamni kechuviga qarab asosiy dorilar ro'yxati Milliy klinik protokollarda keltirilgan dori vositalarga o'zgartirish kiritiladi**  
**-kasallikning asoratlanishi kuzatilsa, asorat turiga qarab dori vositalari korrektsiya qilinadi.**

Davolash tadbirlari (asosiy medikamentoz davo)		Davolash tadbirlari (asosiy medikamentoz davo)					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozasi
		Ambulator yordam		Bir kurslik dozirovka				
		OSH /OP	KT MP	Tuman (shahar) shifoxonalar	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi							
Vitamin D3	<b>1. Ichishga , 0 – 1 yosh – 1500ME, 1 – 5 yosh -2500ME, ot 6 – 18 yosh 3000ME</b>	+	+	+	+	+	0 – 1 yosh – 1500ME, 1 – 5 yosh -2500ME, ot 6 – 18 yosh 3000ME	1 fl
Xolekaltsiferol (Akvadetrim)	<b>2. Ichishga , 1 yoshgacha – 10 mg; 1-6 yosh – 22 mg; 6-10 yosh – 25 mg; 10-16 yosh – 28 mg; 16-18 let – 32 mg.</b>	+	+	+	+	+	1 yoshgacha – 10 mg; 1-6 yosh – 22 mg; 6-10 yosh – 25 mg; 10-16 yosh – 28 mg; 16-18 let – 32 mg.	2 up
Энтеросорбент терапия Диоксид кремний юкоридисперли + Лактулоза	... 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar: kuniga 1 marta 1 sashe-paket; 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar: kuniga 2 marta 1 sashe-paket; 12 yoshdan oshgan bolalar va kattalar: kuniga 3 marta 1 sashe-paket. Mahsulotning tayyorlangan suvli suspenziyasi ovqatdan yoki dori-darmonlardan 1 soat oldin og'iz orqali olinadi.	+	+	+	+	+	3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar: kuniga 1 marta 1 sashe-paket; 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar: kuniga 2 marta 1 sashe-paket; 12 yoshdan oshgan bolalar va kattalar: kuniga 3 marta 1 sashe-paket. Mahsulotning tayyorlangan suvli suspenziyasi ovqatdan yoki dori-darmonlardan 1 soat	2 up

							oldin og'iz orqali olinadi.	
Probulard Bioterol	4 yoshdan 6 yoshgacha - kuniga 1 marta 1 kapsuladan; - 6 yoshdan va kattalar - kuniga 2 marta 1 kapsuladan. Qo'llash bo'yicha ko'rsatmalar: 6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun kapsulaning tarkibini bir stakan suyuqlikka (xona haroratiga qadar sovutilgan qaynatilgan suv, bolalar ovqati) bir martalik dozada quyding.	+	+	+	+	+	4 yoshdan 6 yoshgacha - kuniga 1 marta 1 kapsuladan; - 6 yoshdan va kattalar - kuniga 2 marta 1 kapsuladan. Qo'llash bo'yicha ko'rsatmalar: 6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun kapsulaning tarkibini bir stakan suyuqlikka (xona haroratiga qadar sovutilgan qaynatilgan suv, bolalar ovqati) bir martalik dozada quyding.	2up

**Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq) shifoxonaga bog'lik bo'lmagan zotiljamni kechuviga qarab qo'shimcha dorilar ro'yxati Milliy klinik protokollarda keltirilgan dori vositalarga o'zgartirish kiritiladi;**  
**- kasallik asoratlanishi kuzatilsa, asorat turiga qarab dori vositalari korrektsiya qilinadi.**

**(REJALI JARROHLIK AMALIYOTI)**

Davolash tadbirlari (operativ davo)	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha				
	Ambulator yordam		Stasionar yordam		
Jarrohlik amaliyoti/aralashuv/muolaja nomi	OSH/OP	KTMP	Tuman (shahar shifoxonalari)	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari
1.	qo'llanilmaydi	qo'llanilmaydi	Jarrohlik o'tkaziladigan bemorni tayyorgarligi	Jarrohlik o'tkaziladigan bemorni tayyorgarligi	
2.	qo'llanilmaydi	qo'llanilmaydi	O'tkaziladigan jarrohlik turini nomi qanday o'tkazilishi bosqichlari yoritiladi	O'tkaziladigan jarrohlik turini nomi qanday o'tkazilishi bosqichlari yoritiladi	
...					
<b>Izoh:*</b> jarroxlik amaliyotini o'tkazish uchun sharoit mavjud bo'lgan xususiy stasionarda o'tkazilishi talab qilinadi;					

**(DAVOLOVCHI OVQATLANISH/PARHEZ)**

Ovqatlanish tartibi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha				
	Ambulator yordam		Stasionar yordam		
Parhez stoli va uning davomiyligi	OSH/OP	KTMP	Tuman (shahar shifoxonalari)	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari
1. Parhez (stol №1A keyinchalik 1B stoli)	Osh	1. Osh 2. Pediatr 3. Pulmonolog 3. Kardiolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Kardiolog 4. LOR	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Kardiolog 4. LOR	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Kardiolog 4. LOR
fizioterapiya	1. Osh 2. Pediatr 3. Gastroenterolog 4. Fizioterapiya Shifokori	1. Osh 2. Pediatr 3. Gastroenterolog 4. Fizioterapiya Shifokori	1. Osh 2. Pediatr 3. Gastroenterolog 4. Fizioterapiya Shifokori	1. Pediatr 2. Gastroenterolog 3. Fizioterapiya Shifokori	1. Pediatr 2. Gastroenterolog 3. Fizioterapiya Shifokori

**NOZOLOGIYA BO'YICHA TEZ VA SHOSHILINCH TIBBIY YORDAM KO'RSATISH HOLATLARDA**

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Tez va shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam				
		TTYO/ uy sharoitida	OP / OSH P / KTM P	Tumanlararo shoshilinch yordam markazi	Viloyat shoshilinch tez tibbiy yordam IIATM filiali	Respublika shoshilinch va tez tibbiy yordam IIAT markazi		
Asosiy mutaxassis (shifokor) maslahati	1.							
	2.							
	...							
<b>Izoh:</b>								
Mutaxassis (shifokor) maslahati (qo'shimcha)	1.							
	2.							
	...							
<b>Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)</b>								
Asosiy laborator tekshiruvlar	1.							
	2.							
	...							
<b>Izoh:</b>								
Qo'shimcha laborator tekshiruvlar	1.							
	2.							
	...							
<b>Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)</b>								
Asosiy instrumental tekshiruvlar	1.							
	2.							
	...							
<b>Izoh:</b>								
Qo'shimcha instrumental tekshiruvlar	1.							
	2.							
	...							
<b>Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)</b>								

**\* Shoshilinch stasionar davoga ko'rsatma: (bu erga ambulator davo jarayonida paydo bo'ladigan stasionar davoga ko'rsatmalar yoziladi)**

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Tez va shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam				
		TTYO/ uy sharoitida	OP / OSH P / KTM P	Tumanlararo shoshilinch yordam markazi	Viloyat shoshilinch tez tibbiy yordam IIATM filiali	Respublika shoshilinch va tez tibbiy yordam IIAT markazi		
Boshqa turdagi tekshiruvlar	1.							
	2.							
	...							
<b>Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)</b>								

**(MEDIKAMENTOZ DAVO)**

Davolash tadbirlari (asosiy medikamentoz davo)		Tez va shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator yordam		Stasionar yordam				
		TTYO/ uy sharoitida	OP / OSH P / KTM P	Tumanlararo shoshilinch yordam markazi	Viloyat shoshilinch tez tibbiy yordam IIATM filiali	Respublika shoshilinch va tez tibbiy yordam IIAT markazi		
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi							
1.								
2.								
...								

**Izoh:**

Davolash tadbirlari (qo'shimcha medikamentoz davo)		Davolash tadbirlari (asosiy medikamentoz davo)					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator yordam		Stasionar yordam				
		TTYO/ uy sharoitida	OP / OSH P / KTM P	Tumanlararo shoshilinch yordam markazi	Viloyat shoshilinch tez tibbiy yordam IIATM filiali	Respublika shoshilinch va tez tibbiy yordam IIAT markazi		
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi							
1.	1.							
2.	2.							
...	...							

**Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)**

**(TEZ VA SHOSHILINCH JARROHLIK AMALIYOTI)**

Davolash tadbirlari (operativ davo)	Tez va shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha				
	Ambulator yordam		Stasionar yordam		
	TTYO/ uy sharoitida	OP / OSHP / KTMP	Tumanlararo shoshilinch yordam markazi	Viloyat shoshilinch tez tibbiy yordam IIATM filiali	Respublika shoshilinch va tez tibbiy yordam IIAT markazi
1.					
2.					
...					

**Izoh: (bu erga jarrohlik amaliyoti/aralashuv/muolajani o'tkazish uchun ko'rsatma keltiriladi)**

**(DAVOLOVCHI OVQATLANISH/PARHEZ)**

Ovqatlanish tartibi	Tez va shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha				
	Ambulator yordam		Stasionar yordam		
	TTYO/ uy sharoitida	OP / OSH P / KTM P	Tumanlararo shoshilinch yordam markazi	Viloyat shoshilinch tez tibbiy yordam IIATM filiali	Respublika shoshilinch va tez tibbiy yordam IIAT markazi
Parhez (stol №1A keyinchalik 1B stoli)	+	+	+	+	+

**Izoh: (stasionardan chiqishga ko'rsatma/ rejali shifoxonaga o'tkazishga ko'rsatma to'liq yozilishi kerak)**

(DISPANSERIZASIYA)

(SOG'LOM KONTINGENT DISPANSERIZASIYASI/"D" NAZORATGA OLINGAN BEMOR DISPANSERIZASIYASI)

Dispanserizasiya tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	OSHP / OP	KTMP	Tadbirlar minimal soni	Dispanser nazorati muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati	1. Shifokorning klinik va fizikal tekshiruvlari	1. Osh 2. pulmonolog 3.gastroenterolog 4. LOR	1. Osh 2. pulmonolog 3.gastroenterolog 4. LOR	1. Birlamchi shifoxonada davolanib chiqqandan so'ng 1-3 oy davomida shifokor nazorati; 2. Surunkali shaklga o'tsa 1-chi yil har 3 oyda, keyingi yillar yilda 2 marta (baxor va kuzda) "D" nazorati o'tkaziladi; 3. Yilda 2 Martava ko'rsatmaga muvofiq klinik, fizikal, laborator, tekshiruvlarni o'tkazish; 4. Yilda 1 marta instrumental (EFGDS) o'tkaziladi; 5.Ko'rsatmaga muvofiq boshqa tor mutaxassisslar ko'ruvi va qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazish; 6. Kasallik residivi yoki asoratlangan holatida yo'llanma asosida stasionar davoga yuborish.	"D" nazoratda turgan bolalarda kasallik xuruji kuzatilganida yilda kamida 1 marta stasionar davo o'tkazish;  . kasallik asoratlanishi kuzatilganida RISHTYOIATM va RIPIATM va ularning viloyat filiallarida jarrohlik amaliyotini o'tkazish
	2.				
	...				

**Izoh:**

<b>Laborator tekshiruvlar</b>	<b>1.</b>				
	<b>2.</b>				
	<b>...</b>				

**Izoh:**

<b>Instrumental tekshiruvlar</b>	<b>1.</b>				
	<b>2.</b>				
	<b>...</b>				

**Izoh:**

**(BIRLAMCHI, IKKILAMCHI VA UCHLAMCHI PROFILAKTIKA/ SKRINING)**

Profilaktika tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	OSHP / OP	KTMP	Tadbirlar minimal soni	Reabilitasiya muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati	1.				
	2.				
	...				
<b>Izoh:</b>					
Laborator tekshiruvlar	1.				
	2.				
	...				
<b>Izoh:</b>					
Instrumental tekshiruvlar	1.				
	2.				
	...				
<b>Izoh:</b>					
Profilaktika usullar	<p>Birlamchi profilaktika-respirator virusli infeksiyalar rivojlanishining oldini olish bo'yicha chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Qo'l gigienasiga rioya qiling. Qo'lingizni iloji boricha tez-tez sovun va suv bilan yuving, ayniqsa yo'tal yoki aksirishdan keyin. Qo'llarni tarkibida spirt bo'lgan vositalar bilan tozaalash ham samaralidir.</li> <li>2. Yo'talayotganda yoki aksirayotganda og'iz va burunni qog'oz salfetka bilan yoping.</li> <li>3. Sog'lom turmush tarzini olib borish kerak: jismoniy mashqlar va sport bilan shug'ullanish, toza havoda tez-tez sayr qilish. Odamlar bo'lishi mumkin bo'lgan xonada chekmaslik juda muhim: tutun bronxial funktsiyaga va immunitetga zararli ta'sir ko'rsatadi.</li> <li>4. Oqsil, elementlari va vitaminlar</li> </ol>	+	+	Doimiy	1 oygacha

	<p>(yangi sabzavot, meva, go'sht, baliq, sut va sut mahsulotlari har kuni rasionda bo'lishi kerak).</p> <p>5. Sovuq havoning boshlanishi va nafas olish yo'llari infeksiyalari ko'payishidan oldin grippga qarshi emlashingiz kerak va emlash jadvali bo'yicha pnevmo vaktinasini qabul qilish lozim.</p> <p>6. Sovuq mavsumda ob — havoga qarab kiyinishingiz, gipotermiyadan, yozda esa elvizaklardan qochishingiz kerak.</p> <p>7. Qo'lingizni iloji boricha tez-tez yuving va burun yo'llarini gipertonik eritmalar bilan yuving.</p> <p>8. Binolarda shamollatish va nam tozalash rejimiga rioya qilish kerak</p> <p>9. Gripp bilan kasallanishning ko'payishi davrida kasal odamlar bilan aloqa qilmaslik, nafas olish tizimini himoya qilish uchun niqobdan foydalanish va odamlar ko'p bo'lgan joylarga tashrif buyurishdan bosh tortish tavsiya etiladi.</p> <p>10. Xonalarni shamollatish va nam tozalash rejimiga rioya qilish.</p> <p>11. Agar uyda yoki uzoq vaqt turadigan muassasada kondisioneringiz bo'lsa, uning toza ekanligiga ishonch hosil qiling.</p>				
	<p>2. Ikkilamchi profilaktika - choralari unga moyil bo'lgan yoki yaqinda u bilan kasallangan bolalarda zotijamning oldini olishga qaratilgan. Bunday bemorlar shifokor tomonidan kuzatilishi kerak, ular vaqti-vaqti bilan testlardan o'tadilar va flyurografik tekshiruvlardan o'tadilar.</p>	+	+	Tez tez kasallanuvchi bollarda doimiy	3-4 oy vrach nazoratida

	Tavsiyalarga quyidagilar kiradi: maxsus jismoniy mashqlarni bajarish ko'krak qafasidagi massaji, fizioterapiya muolajalari vitaminlarni qabul qilish (asosan V va C guruhlari).				
	3. Uchlamchi profilaktika zotiljamdan keyin og'ir asoratlari bo'lgan yoki kasallik surunkali xarakterga ega bo'lgan bemorlarni rehabilitasiya qilishni nazarda tutadi, bu esa odamning to'liq ishlashiga to'sqinlik qiladi.	+	+	Doimiy	1 yil davomida
<b>Izoh:</b>					
<b>Davolash tadbirlari (nomedikamentoz davo)</b>					
<b>Profilaktik fito/dori vositalarining (xalqaro patentlanmagan) nomi</b>	<b>Profilaktik fito/dori vositalari dozirovkasi va qo'llanilishi</b>	<b>OSHP / OP</b>	<b>KTMP</b>	<b>O'rtacha sutkalik dozirovkasi</b>	<b>Bir kurslik dozirovka</b>
1.					
2.					
...					
<b>Izoh:</b>					

(REABILITASIYA)

Reabilitasiya tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	Uy sharoitida	OSHP / OP / KTMP	Stasionar sharoitida	Tadbirlar minimal soni	Reabilitasiya muddati
<b>Mutaxassis (shifokor) maslahati</b>	1.	Kun tartibi; To'g'ri ovqatlantirish; Nafas gimnastikasi; massaj	Vrachlar nazoratida bulish			
	2.					
	...					
<b>Izoh:</b>						
<b>Laborator tekshiruvlar</b>	1.					
	2.					
	...					
<b>Izoh:</b>						
<b>Instrumental tekshiruvlar</b>	1.					
	2.					
	...					
<b>Izoh:</b>						
<b>* Bu erga nozologiya bo'yicha bemorlarni uy/poliklinikv/stasionar sharoitida o'tkazilishi kerak bo'lgan reabilitasiyaga ko'rsatmalar kiritilishi kerak</b>						
<b>Reabilitasion usullar</b>	1.					
	2.					
	...					
<b>Izoh:</b>						
<b>Davolash tadbirlari (medikamentoz davo)</b>		<b>Uy sharoitida</b>	<b>OSHP / OP / KTMP</b>	<b>Stasionar sharoitida</b>	<b>O'rtacha sutkalik dozirovkasi</b>	<b>Bir kurslik dozirovka</b>
<b>Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi</b>	<b>Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi</b>					
1.						
2.						
...						
<b>Izoh:</b>						

(PALLIATIV DAVO)

Palliativ tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	Uy sharoitida	OSHP / OP / KTMP	Stasionar sharoitida	Tadbirlar minimal soni	Reabilitasiya muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati	1.					
	2.					
	...					
<b>Izoh:</b>						
Laborator tekshiruvlar	1.					
	2.					
	...					
<b>Izoh:</b>						
Instrumental tekshiruvlar	1.					
	2.					
	...					
<b>Izoh:</b>						
<b>* Bu erga nozologiya bo'yicha bemorlarni uy/poliklinikv/stasionar sharoitida o'tkazilishi kerak bo'lgan palliativ davoga ko'rsatmalar kiritilishi kerak</b>						
Паллиатив даво усуллар	1.					
	2.					
	...					
<b>Izoh:</b>						
Davolash tadbirlari (medikamentoz/nomedikamentoz davo)		Uy sharoitida	OSHP / OP / KTMP	Stasionar sharoitida	O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
Dori-vositasi/fito - preparatning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositasi/fito - preparatning dozirovkasi va qo'llanilishi					
1.						
2.						
...						
<b>Izoh:</b>						