

O'zbekiston Respublikasi
Sog'liqni saqlash vazirining
2025 yil "23" iyundagi
180-sonli buyrug'iga
ilova

**SURUNKALI BRONXIT NOZOLOGIYASI BO'YICHA TIBBIY XIZMAT
KO'RSATISH MILLIY KLINIK STANDARTI**



“TASDIQLAYMAN”

O'ZR SSV RIPIATM direktori

A.A. Abdukayumov

” _____ 2025-yil

**SURUNKALI BRONXIT NOZOLOGIYASI BO‘YICHA TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH MILLIY
KLINIK STANDARTI**

Toshkent 2025

**SURUNKALI BRONXIT_(nozologiya nomi) NOZOLOGIYASI BO‘YICHA TIBBIY XIZMAT
KO‘RSATISH MILLIY KLINIK STANDARTI**

**MILLIY KLINIK STANDART NOZOLOGIYASINING NOMI (KODI), TASHXISLASH VA DAVOLASHGA
JALB ETILADIGAN MUTAXASSISLAR NOMI**

XKT-10/11 bo'yicha kodlanishi:	Nozologik nomlanishi:	Nozologiya bo'yicha ambulatoriya sharoitida tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar		Nozologiya bo'yicha statsionar sharoitda tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar	
		Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo'shimcha jalb etiladigan mutaxassislar	Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo'shimcha jalb etiladigan mutaxassislar
J40 J41.0 J41.1 J41.8 J42 МКБ – 11 CA20. 12 CA20. 11 CA20. 10 CA20. 13 CA20. 1Z CA20. 1Y CA20. 1	O'tkir yoki surunkali deb ko'rsatilmagan bronxit Oddiy surunkali bronxit Shilliq-yiringli surunkali bronxit Aralash, oddiy va shilliq-yiringli surunkali bronxit Surunkali bronxit, aniqlanmagan aralash, oddiy va shilliq -yiringli surunkali bronxit shilliq -yiringli surunkali bronxit oddiy surunkali bronxit cho'ziluvchan bakterial bronxit aniqlanmagan surunkali bronxit boshqa aniqlangan surunkali bronxit surunkali bronxit	1. OSH 2. Pediatr	1.Lor 2. Kardiolog 3. Nevropotolog 4. Allergolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Allergolog	3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6. Allergolog

***standartni to'ldirish jarayonida nozologiya, uning kattalar, xomiladorlar, bolalar va qariyalarda kechuvi hamda nozologiya bo'yicha kasallikni davri xususiyatidan kelib chiqish talab etiladi. Shuningdek, nozologiya ga to'g'ri kelmaydigan jadvallarni to'ldirish tavsiya qilinmaydi. (Misol uchun, jarroxlik amaliyoti nozologiyasida o'tkazilmasa (JARROHLIK AMALIYOTI) jadvali to'ldirilmaydi yoki nozologiyada palliativ davo ko'zda tutilmasa – (PALLIATIV DAVO) jadvali to'ldirilmaydi.**

SURUNKALI BRONXIT NOZOLOGIYA BO'YICHA REJALI TASHXISLASH, DAVOLASH, REABILITATSIYA VA DISPANSERIZATSIYA TADBIRLARI

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Asosiy mutaxassis (shifokor) maslahati	Shikoyati va anamnez (kasallik va hayot anamnezi)	1. OSH 2. Pediatr	1. OSH 2. Pediatr 3. Pulmonolog 4. Allergolog 5. Gastroenterolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6. Allergolog 5. Gastroenterolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6. Allergolog 5. Gastroenterolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6. Allergolo 5. Gastroenterolog	Tibbiy ko'rik davrida yilda kamida 2 marta; – Kasallik bo'yicha murojaat bo'lganida 2 marta va ko'rsatma bo'lganida	- Kasallik bo'yicha murojaat bo'lganida 1 marta va ko'rsatma bo'lganida to'liq ko'ruvni o'tkazadi
	Obyektiv ko'rik	1. OSH 2. Pediatr	1. OSH 2. Pediatr 3. Pulmonolog 4. Allergolog 5. Gastroenterolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6. Allergolog 5. Gastroenterolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6. Allergolog 5. Gastroenterolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6. Allergolo 5. Gastroenterolog	Tibbiy ko'rik davrida yilda kamida 2 marta; – Kasallik bo'yicha murojaat bo'lganida 2 marta va ko'rsatma bo'lganida	- bo'yicha murojaat bo'lganida 1 marta va ko'rsatma bo'lganida to'liq ko'ruvni o'tkazadi
	Fizikal va klinik tekshiruv	1. OSH 2. Pediatr	1. OSH 2. Pediatr 3. Pulmonolog 4. Allergolog 5. Gastroenterolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6. Allergolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6. Allergolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6. Allergolo	Tibbiy ko'rik davrida yilda kamida 2 marta; – Kasallik bo'yicha	- bo'yicha murojaat bo'lganida 1 marta va ko'rsatma bo'lganida

				5.Gastroenterolog	5.Gastroenterolog	5.Gastroenterolog	murojaat bo'lganida 2 marta va ko'rsatma bo'lganida	to'liq ko'ruvni o'tkazadi
Izoh:								
Mutaxassis (shifokor) maslahati (qo'shimcha)	1. Tibbiy ko'rik (havf omillarini aniqlash)	1. OSH 2. Pediatr	1. OSH 2. Pediatr 3. Pulmonolog 4. Allergolog 5.Gastroenterolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6. Allergolog 5.Gastroenterolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6. Allergolog 5.Gastroenterolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6. Allergolog 5.Gastroenterolog	Tibbiy ko'rik davrida yilda kamida 2 marta; – Kasallik bo'yicha murojaat bo'lganida 2 marta va ko'rsatma bo'lganida	Davolash davomiyligi: havf omili aniqlanmaganda: 21 kun; havf omili aniqlanganda: holati yaxshilangunga qadar - Murojaat qilganda havf omilini aniqlash; - statsionarda davolash tavsiyasi beriladi; - shifoxonadan chiqishda ambulator nazorat uchun tavsiyalar beriladi.
	2. Havf omillarini bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar	1. OSH 2. Pediatr	1. OSH 2. Pediatr 3. Pulmonolog 4. Allergolog 5.Gastroenterolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6. Allergolog 5.Gastroenterolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6. Allergolog 5.Gastroenterolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6. Allergolog 5.Gastroenterolog		Davolash davomiyligi: havf omili aniqlanmaganda: 3-5 kun; havf omili aniqlanganda: holati yaxshilangunga

								qadar- Murojaat qilganda havf omilini aniqlash; - stasionarda davolash tavsiyasi beriladi; - shifoxonadan chiqishda ambulator nazorat uchun tavsiyalar beriladi.
	...							

Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq) bemorda qo'shimcha boshqa yoki yondosh kasalliklari aniqlangan holatda, ko'rsatmaga muvofiq **Milliy klinik protokollarda keltirilgan** boshqa tegishli tor doirasidagi mutaxassislarning ko'rigi o'tkazilishi talab etiladi;

- kasallikni asoratlangan holatida murojaat bo'lsa va/yoki aniqlansa, shuningdek jarrohlik amaliyotiga ko'rsatma bo'lgan holatlarda **shoshilinch jarrox konsultatsiyasi** o'tkaziladi, bemor holatiga qarab shifoxonaga statsionar davoga va/yoki jarroxlik amaliyotini o'tkazish uchun yo'naltiriladi.

Asosiy laborator tekshiruvlar	Asosiy: 1. Qonning umumiy (klinik) taxlili	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		– Kasallik bo'yicha murojaat bo'lganida 1 marta va/yoki ko'rsatmaga muvofiq
	2. Siydikning umumiy (klinik) tahlili	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		
	3. Balgamning bakteriologik ekmasi	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	
4. Bioximik kon taxlili, S reaktiv oksili va koagulogramma aniqlash uchun tekshiruv	bajariladi	kullaniladi	kullaniladi	kullaniladi	kullaniladi	kullaniladi		
5. Prokalsitonin,								
6. Tomokdan surtma	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		
	7. Qon guruxini aniqlash	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		
	8. KSHS	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		

	9. Kislorod saturatsiyasini aniqlash	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		
Izoh: birlamchi murojaat qilingan shifokor tomonidan laborator tekshiruvlarni o'tkazilishi talab etiladi, keyingi darajaga tor mutaxassislar ko'ruviga shu taxlillar natijalari yo'naltiriladi. Laborator tekshiruvni takroriy o'tkazilishi, tor mutaxassis yoki statsionar davolanish jarayonida ko'rsatma bo'lganidagina o'tkaziladi.								
Qo'shimcha laborator tekshiruvlar	Qo'shimcha: Bemorni konsultatsiya qilishda yondosh kasalliklari aniqlanganda, tibbiyot muassasalari darajasidan kelib chiqib mavjud laborator tekshiruvlari o'tkaziladi.							
	Biokimyoviy qon taxlili	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi		
	C-reaktiv oqsil	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi		
	qon plazmasida prokalsitonin taxlili	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi		
	Immunologik tadqiqotlar (immun holati, IgA, IgG, IgM, IgE)	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi		
	Koagulogramma	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi		
	Qonda elektrolitlar miqdori	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi		
	Sterillikka qon tekshirish	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi		
	Konda D-Dimer aniklash	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi		
	Ichak mikrobiotasini tekshirish	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		
Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)								
Asosiy	1. Asosiy: 1. kukrak kafasi	qo'llanilmaydi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		- Kasallik

instrumental tekshiruvlar	rentgen. Kursatmaga kura MSKT							bo'yicha murojaat
	2.EKG	qo'llanilmaydi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		bo'lganida 1
	3. Qorin bo'shlig'i a'zolari UTT	qo'llanilmaydi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		marta va/yoki
	4. Spirografiya	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		ko'rsatmaga muvofiq

Izoh: instrumental diagnostik tekshiruvlar birlamchi murojaat qilingan shifokor tomonidan o'tkaziladi. Agarda, boshqa darajadagi tibbiyot muassasasida davolanishga ko'rsatma paydo bo'lsa, shu o'tkazilgan tekshiruv nusxalari bilan yo'naltiriladi. Instrumental diagnostik tekshiruvni takroriy o'tkazilishi, tor mutaxassis yoki statsionar davolanish jarayonida ko'rsatma bo'lganidagina o'tkaziladi.

Qo'shimcha instrumental tekshiruvlar	1. Bemorni konsultatsiya qilishda yondosh kasalliklari aniqlanganda, tibbiyot muassasalari darajasidan kelib chiqib mavjud instrumental diagnostik tekshiruvlari o'tkaziladi.							
	pikfloumetriya							
	pulsoksimetriya							
	plevra va plevra bo'shlig'ining ultratovush tekshiruvi	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		
	fibrobronkopsiya (bronxoalveolyar suyuqlikni tekshirish, biopsiya olish)	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		
	jarrohlik va biopsiya materialini gistologik tekshirish	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		
	Exokardiografiya	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		
	burun sinuslarning rentgenografiyasi	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		

	bronxografiya, bronxoskopiya	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi		
Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)								
*STATSIONAR DAVOGA KO'RSATMA: (bu yerga ambulator davo jarayonida paydo bo'ladigan statsionar davoga ko'rsatmalar yoziladi)								

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Boshqa turdagi tekshiruvlar	1.							
	2.							
	...							

Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)

(MEDIKAMENTOZ DAVO)

Davolash tadbirlari (asosiy medikamentoz davo)			Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
			Ambulator yordam		Statsionar yordam				
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Aminopenitsillin	Amoksitsillin	ichishga, 100-150 mg/kg/sut, 2-3 marta/sut	+	+	-	-	-	100-150 mg/kg/sut, 2-3 marta/sut	2up
	Amoksitsillin/klavulanat	ichishga, 100-150 mg/kg/sut, 2-3 marta/sut	+	+	-	-	-	100-150 mg/kg/sut, 2-3 marta/sut	2up
	Amoksitsillin/sulbaktam	ichishga, 100-150 mg/kg/sut, 2-3 marta/sut	+	+	-	-	-	100-150 mg/kg/sut, 2-3 marta/sut	2up
	Sultamitsillin	ichishga, 50-100 mg/kg/sut, 2-3 marta/sut	+	+	-	-	-	50-100 mg/kg/sut, 2-3 marta/sut	2up
	Benzilpenitsillin	V/i, m/o, 1,0-5,0 Yed/kg/sut, 4-6 mar/sut	+	+	+	+	+	V/i, m/o, 1,0-5,0 Yed/kg/sut, 4-6 mar/sut	14fl
	Ampitsillin	V/i, m/o, 200-400 mg/kg/sut, 4 mar/sut	+	+	+	+	+	V/i, m/o, 200-400 mg/kg/sut, 4 mar/sut	14fl

	Oksatsillin	V/i, m/o 300-450 mg/kg/sut, 4-6 mar/sut	+	+	+	+	+	V/i, m/o 300-450 mg/kg/sut, 4-6 mar/sut	14fl
	Amoksitsillin/ klavulanat	V/i, m/o, 3 oylikdan - 80 mg/kg (kg <4 kg) yoki 100 mg/kg (vazn > 4 kg), keyin 3 oy , 3-4 mar/sut	+	+	+	+	+	V/i, m/o, 3 oylikdan - 80 mg/kg (kg <4 kg) yoki 100 mg/kg (vazn > 4 kg), keyin 3 oy , 3-4 mar/sut	14fl
	Amoksitsillin/ sulbaktam	V/i, m/o, 2 yoshgacha – 100-150 mg/kg/sut, 2-6 yosh – 750 mg, 6-12 yosh – 1,5 g, 12 yoshdan keyin – 2-3 g, , 2-3 mar/sut	+	+	+	+	+	V/i, m/o, 2 yoshgacha – 100-150 mg/kg/sut, 2-6 yosh – 750 mg, 6-12 yosh – 1,5 g, 12 yoshdan keyin – 2-3 g, , 2-3 mar/sut	14fl
	Ampitsillin/ sultaktam	V/i, m/o 150 mg/kg/sut, 3-4 mar/sut	+	+	+	+	+	V/i, m/o 150 mg/kg/sut, 3-4 mar/sut	14fl
Sefalosporin - 2	Sefuroksim	ichishga, 20-30mg/kg (500 mg/sut, 2 marta /sut ko'rsatmaga ko'ra	+	+	+	+	+	ichishga, 20-30mg/kg (500 mg/sut, 2 marta /sut ko'rsatmaga ko'ra	1up
	Sefaklor	ichishga, 20-40 mg/kg (1500 mg/sutkup bo'lmagan, 2-3 marta /sut ko'rsatmaga ko'ra	+	+	+	+	+	ichishga, 20-40 mg/kg (1500 mg/sutkup bo'lmagan, 2-3 marta /sut ko'rsatmaga ko'ra	2up
	Sefuroksim	V/i, m/o 30-100 mg/kg/sut, 2 mar/sut	-	-	+	+	+	V/i, m/o 30-100 mg/kg/sut, 2 mar/sut	14fl
Sefalosporin - 3	Sefotaksim	V/i, m/o 100-150 mg/kg/sut, 2 mar/sut	-	-	+	+	+	V/i, m/o 100-150 mg/kg/sut, 2 mar/sut	14fl
	Seftriakson	V/i, m/o 50-100 mg/kg /sut, 1-2 mar/sut	-	-	+	+	+	V/i, m/o 50-100 mg/kg /sut, 1-2 mar/sut	14fl
	Seftazidim	V/i, m/o 100-150 mg/kg (6 g ko'p emas), 2 oylikgacha - 25-60 mg/kg/sut, 2 m/sut	-	-	+	+	+	V/i, m/o 100-150 mg/kg (6 g ko'p emas), 2 oylikgacha - 25-60 mg/kg/sut, 2 m/sut	14fl
	Sefoperazon	V/i, m/o 100-200 mg/kg/sut, 2m/sut	-	-	+	+	+	V/i, m/o 100-200 mg/kg/sut, 2 m/sut	14fl

IZSS-3	Sefoperazon/ sulbaktam	V/i, m/o 100-160 mg/kg/sut, 2 m/sut	-	-	+	+	+	V/i, m/o 100-160 mg/kg/sut, 2m/sut	14fl
	Sefotaksim/sulba ktam	V/i, m/o 100-160 mg/kg/sut, 2 marta	-	-	+	+	+	V/i, m/o 100-160 mg/kg/sut, 2marta	14fl
SS-4	Sefepim	V/i, m/o 100-150 mg/kg/sut, 2marta	-	-	+	+	+	V/i, m/o 100-150 mg/kg/sut, 2marta	14fl
IZSS-4	Sefipim/ sulbaktam	V/i, m/o 100-150 mg/kg (sefipimga) /sut, 2 marta	-	-	+	+	+	V/i, m/o 100-150 mg/kg (sefipimga) /sut, 2 marta	14fl
Karbapenem	Imipenem	V/i, m/o V/i- 60 mg/kg, m\o – 1-1,5 g/sut, 3 mart	-	-	+	+	+	V/i, m/o V/i- 60 mg/kg, m\o – 1-1,5 g/sut, 3 mart	30 fl
	Meropenem	V/i, 30-60 mg/kg/sut, 2-3 marta/sut, 2-3 marta	-	-	+	+	+	V/i, 30-60 mg/kg/sut, 2-3 marta/sut, 2-3 marta	30fl
	Ertapenem	V/i, m/o 30 mg/kg (1 g dan ko'p)	-	-	+	+	+	V/i, m/o 30 mg/kg (1 g dan ko'p)	30fl
Aminogliko- zid	Amikatsin	V/i, m/o 10-20 mg/kg/sut, 1-2 marta	-	-	+	+	+	V/i, m/o 10-20 mg/kg/sut, 1- 2 marta	14fl
	Gentamitsin	V/i, m/o 3-5 mg/kg/sut, 1- 2 max 8-12 mg/kg 2 max ingalyatsiya	-	-	+	+	+	V/i, m/o 3-5 mg/kg/sut, 1-2 max 8-12 mg/kg 2 max ingalyatsiya	14fl
	Netilmitsin	V/i, m/o 4-6,5 mg/kg/sut, 1-2 max	-	-	+	+	+	V/i, m/o 4-6,5 mg/kg/sut, 1- 2 max	14fl
	Tobramitsin	V/i, m/o 3-5 mg/kg/sut, 1- 2 raza 300 mg/5ml ingalyatsiya 2	-	-	+	+	+	V/i, m/o 3-5 mg/kg/sut, 1-2 max 300 mg/5ml ingalyatsiya 2 max	14fl

		max							
	Piperatsillin (tazabaktam)	90 mg\kg kuniga V/i	-	-	+	+	+	90 mg/kg kuniga V/i 2 max 14 kun	28 fl
	Tikarsillin/klavulanat	80-200 mg\kg kuniga	-	-	+	+	+	80-200 mg/kg kuniga	14fl
Makrolidlar	Azitromitsin	ichishga, 10 mg/kg/sut, sutkada 1 marta	+	+	+	+	+	ichishga, 10 mg/kg/sut, sutkada 1 marta	1 up
	Azitromitsin	V/i, 10 mg/kg (500 mgdan ko'p emas)* /sut, 1 marta	+	+	+	+	+	V/i, 10 mg/kg (500 mgdan ko'p emas)* /sut, 1 marta	7fl
	Azitromitsin	Tilarang staf. va kuk yiring tayokchasi aniklangan xolatlarda 10 mg/kg/sut xaftada 3 marta 1 max 3 oy, sung 1 oy tanaffus va yana 3 oy 10 mg/kg/sut buyuriladi, doimiy	+	+	+	+	+	Tilarang staf. va kuk yiring tayokchasi aniklangan xolatlarda 10 mg/kg/sut xaftada 3 marta 1 max 3 oy, sung 1 oy tanaffus va yana 3 oy 10 mg/kg/sut buyuriladi, doimiy.	
	Klaritromitsin (Klatsid)	ichishga, 15 mg/kg/sut (500 mg dan kam emas) , 1-2 marta/sut	+	+	+	+	+	ichishga, 15 mg/kg/sut (500 mg dan kam emas) , 1-2 marta/sut	1up
	Roksitromitsin	ichishga, 5-8 mg/kg/sut (300 mg ko'p emas), 2 marta/sut	+	+	+	+	+	ichishga, 5-8 mg/kg/sut (300 mg ko'p emas), 2 marta/sut	1up
	Djozamitsin	ichishga, 40-50 mg/kg/sut, 2-3 mart /sut	-	-	+	+	+	ichishga, 40-50 mg/kg/sut, 2- 3 mart /sut	1up
	Midekamitsin	ichishga, 20-50 mg/kg/sut, 2-3 marta/sut	-	-	+	+	+	ichishga, 20-50 mg/kg/sut, 2- 3 marta/sut	1up

	Spiramitsin	ichishga, 150000-300000 ME/kg/sut, 2-3 mar /sut	-	-	+	+	+	ichishga, 150000-300000 ME/kg/sut, 2-3 mar /sut	1up
	Klindamitsin	ichishga, 8-25 mg/kg/sut, 2-3 mart /sut	-	-	+	+	+	ichishga, 8-25 mg/kg/sut, 2-3 mart /sut	1up
Linkozamid	Linkamitsin	V/i, m/o 10-20 mg/kg/sut, 2 mart	-	-	+	+	+	V/i, m/o 10-20 mg/kg/sut, 2 mart	14fl
	Klindamitsin	V/i, m/o 20-40 mg/kg/sut,3-4 mart	-	-	+	+	+	V/i, m/o 20-40 mg/kg/sut,3-4 mart	14fl
Boshqa antibiotik J01XX01	Fosfomitsin neo	V/i 100-200 mg/kg./sut, 1-2 mart	-	-	+	+	+	V/i 100-200 mg/kg./sut, 1-2 mart	14fl
	Fluimusil	Ingalyatsiya uchun 300 mg 2 max	-	-	+	+	+	Ingalyatsiya uchun 2 max	
	Kolistimetat natriya	Ingalyatsiya uchun 1-4 mln YED kuk yiring tayoqchasi aniqlangan xolda doimiy 2 max	+	+	+	+	+	Ingalyatsiya uchun 1-4 mln YED kuk yiring tayoqchasi aniqlangan xolda doimiy 2 max	
Ftorxinolon-lar	Siprofloksatsin	15-20mg/kg/sut 2 max v/i 7-10 kun	+	+	+	+	+	15-20mg/kg/sut 2 max v/i 7-10 kun	
	Doksitsiklin (12 yoshdan katta)	100-200 mg ichishga 1 max	-	-	+	+	+	100-200 mg ichishga 1 max	
Glikopeptid A07AA09	Vankomitsin	V/i, 40 mg/kg/sut, 3 mart	-	-	-	+	+	V/i, 40 mg/kg/sut, 3 mart	21fl
Oksazolidinon J01XX08	Linezolid	V/i, 20 mg/kg/sut, 2-mart	-	-	-	+	+	V/i, 20 mg/kg/sut, 2-mart	14fl

β2-Agonist	Fenoterol	0,5–0,75 mg (10–15 kapel)	+	+	+	+	+	0,5–0,75 mg (10–15 kapel)	1fl
	Salbutamol (Nebutamol)	Sprey 1–2,5 mg (1–2,5 ml)	+	+	+	+	+	1–2,5 mg (1–2,5 ml)	1fl
Antixoliner-gik	Ipratropiumbromid (atrovent)	Sprey 0,25 mg (1 ml)	+	+	+	+	+	0,25 mg (1 ml)	1fl
Fosfolipidlar-gepatoprotektorlar	Essensial-Fosfolipidlar	300-400 mg kaps.ichishga,v/i	+	+	+	+	+	300-400 mg kaps.ichishga,v/i	
Steroid	Beklometazonid-propionat (beklazon)	Sprey 400–800 mkg/sut	+	+	+	+	+	400–800 mkg/sut	1fl
	Budesonid (pulmikort, benakort)	Ingalyatsiya 400–800 mkg/sut	+	+	+	+	+	0,25 mg/ml, ingalyatsiya uchun dozali kukun 100 mkg/doza	14fl
	Prednizolon	1 (1-2) mg/kg haqiqiy vazn hisobidan, 15-20 kun ichishga; kamaytirish tezligi dastlabki doza bilan aniqlanadi: 15 mg/sut va undan ko'p bo'lsa, har 3-4 kunda 1-1,25 mgga kamaytiriladi; 15-10 mg/sut da har 5-7 kunda 1-1,25 mgga kamaytiriladi; davolanish uzoq davom etishi talab qilinganda	-	-	+	+	+	1 (1-2) mg/kg 15-20 kun ichishga	
Virus qarshi preparat	rekombinantlangan odam interferon alfa-2b	Rektal 7 yoshdan katta bolalarga, —500000 ME 1 supp. Dan. 2 marta sutkada 12soatda 5 kun xar kuni. 7 yoshgacha bolalarga, 150000 ME 1 supp. Dan. 2 marta sutkada 12soatda	-	-	-	+	+	Rektal 7 yoshdan katta bolalarga, —500000 ME 1 supp. Dan. 2 marta sutkada 12soatda 5 kun xar kuni. 7 yoshgacha bolalarga, 150000 ME 1 supp. Dan. 2 marta sutkada 12soatda	2 up

		5 kun xar kuni.						5 kun xar kuni.	
	Interferon gamma, gistamin, CD4 qarshi antanachalar	6 oylikdan tomchilarda, 3 yoshdan oshgan bolalar sxema bo'yicha tabletkalarda: davolashning 1-kunida 8 tabletkadan oling. quyidagi sxema bo'yicha: 1-jadval. birinchi 2 soatda har 30 daqiqada (2 soat ichida jami 5 tabletkadan), keyin o'sha kun davomida yana 1 tabletkadan oling. 3 marta teng oraliqda. 2-kuni va undan keyin 1 tabletkadan oling. To'liq tiklanishigacha kuniga 3 marta.							
	Inozin pranobeks	Peroral, 3 yosh va undan katta bolalar uchun sirop va tabletkalar. Sirop: 3 yosh va undan katta bolalar uchun (tana vazni 15-20 kg dan ortiq) 3-4 dozada tana vazniga 50 mg/kg ni tashkil qiladi. Tabletkalarda: 1/2 tabletkadan. 5 kg tana vazniga, 3-4 dozaga bo'lingan.							
Virus qarshi preparat L03AB05	interferon gammaga antitela, CD 4 ga antitela, gistaminga antitela	1 oylik va undan katta yoshdagi bolalar. Davolashning 1-kunida quyidagi sxema bo'yicha 8 tabletkadan oling: Birinchi 2 soatda har 30 daqiqada 1 tabletkadan (2 soat ichida jami 5 tabletkadan), so'ngra o'sha kun davomida yana 1 tabletkadan 3 marta teng vaqt oralig'ida oling. 2-kuni va undan keyin to'liq	+	+	+	+	+	1 oylik va undan katta yoshdagi bolalar. Davolashning 1-kunida quyidagi sxema bo'yicha 8 tabletkadan oling: Birinchi 2 soatda har 30 daqiqada 1 tabletkadan (2 soat ichida jami 5 tabletkadan), so'ngra o'sha kun davomida yana 1 tabletkadan 3 marta teng vaqt oralig'ida oling. 2-kuni va undan keyin to'liq	2 up

		tiklanishigacha kuniga 3 marta 1 tabletkadan oling.						tiklanishigacha kuniga 3 marta 1 tabletkadan oling.	
Virus qarshi preparat J05AB11	Valatsiklovir	Bolalarga ½ tabletkadan kuniga 2 mahal. - Varicella Zoster virusi keltirib chiqaradigan Zoster uchug'i va suvchechak; - Herpes Simplex virusi keltirib chiqaradigan teri va shilliq pardalarning infeksiyalari (1 va 2 turdagi) - sitomegalovirus (SMV) infeksiyasining ko'payishini kamaytirish uchun.	+	+	+	+	+	Bolalarga ½ tabletkadan kuniga 2 mahal. - Varicella Zoster virusi keltirib chiqaradigan Zoster uchug'i va suvchechak; - Herpes Simplex virusi keltirib chiqaradigan teri va shilliq pardalarning infeksiyalari (1 va 2 turdagi) - sitomegalovirus (SMV) infeksiyasining ko'payishini kamaytirish uchun.	1up
Virus qarshi preparat L03	aminodigidroftalazindion natriya	Rektal: 1 yosh va undan katta bolalar uchun, 1 ta shamchadan har kuni 5 kun, keyin 1 ta shamchadan har kuni 10 kun davomida. Kurs - 15 ta shamcha. Til ostiga tabletkalar. 1 tabletkadan sutkasiga 4 mahalgacha yoki 2 ta tabletkadan sutkasiga 2 mahal 5 kun.	+	+	+	+	+	Rektal: 1 yosh va undan katta bolalar uchun, 1 ta shamchadan har kuni 5 kun, keyin 1 ta shamchadan har kuni 10 kun davomida. Kurs - 15 ta shamcha. Til ostiga tabletkalar. 1 tabletkadan sutkasiga 4 mahalgacha yoki 2 ta tabletkadan sutkasiga 2 mahal 5 kun.	2up
Virus qarshi preparat	Oseltamivir	Faqat gripdda buyuriladi. Peroral 1 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun - kuniga 2 marta 3 mg/kg/doza, 1 yoshdan oshgan bolalar uchun doz bolaning vazniga bog'liq: 15 kg va undan kam - kuniga 2 marta 30 mg, 15-23 kg - 45 mg dan kuniga 2 marta, 23-40 kg - kuniga 2 marta 60 mg, 40 kg dan ortiq - kuniga 2 marta 75 mg							

Virus qarshi preparat	Azoksimera bromid	<p>Parenteral yuborish uchun yeritmalar tayyorlash (mushak ichiga va tomir ichiga): Mushak ichiga yuborish uchun 3 mg preparat 1 ml (2 ml ga 6 mg doza) inyeksiya uchun suvda yoki 0,9% natriy xlorid eritmasida eritiladi. Solventni qo'shgandan so'ng, preparat shishishi uchun 2-3 daqiqaga qoldiriladi, keyin silkitmasdan aylanish harakatlari bilan aralashtiriladi. Vena ichiga tomchilab yuborish uchun preparat 2 ml steril 0,9% natriy xlorid eritmasida eritiladi. Solventni qo'shgandan so'ng, preparat shishishi uchun 2-3 daqiqaga qoldiriladi, keyin aylanish harakatlari bilan aralashtiriladi. Bemor uchun hisoblangan doza steril tarzda 0,9% natriy xlorid eritmasi bo'lgan shisha / sumkaga o'tkaziladi. Intranazal va sublingual foydalanish uchun eritma tayyorlash: bolalar uchun 3 mg dozasi 1,0 ml (20 tomchi), 6 mg dozasi 2,0 ml (40 tomchi) (bir tomchi (0,05 ml)) eritiladi. tayyorlangan eritmada 0,15 mg preparat mavjud).</p>	+	+	+	+	+	<p>Parenteral yuborish uchun yeritmalar tayyorlash (mushak ichiga va tomir ichiga): Mushak ichiga yuborish uchun 3 mg preparat 1 ml (2 ml ga 6 mg doza) inyeksiya uchun suvda yoki 0,9% natriy xlorid eritmasida eritiladi. Solventni qo'shgandan so'ng, preparat shishishi uchun 2-3 daqiqaga qoldiriladi, keyin silkitmasdan aylanish harakatlari bilan aralashtiriladi. Vena ichiga tomchilab yuborish uchun preparat 2 ml steril 0,9% natriy xlorid eritmasida eritiladi. Solventni qo'shgandan so'ng, preparat shishishi uchun 2-3 daqiqaga qoldiriladi, keyin aylanish harakatlari bilan aralashtiriladi. Bemor uchun hisoblangan doza steril tarzda 0,9% natriy xlorid eritmasi bo'lgan shisha / sumkaga o'tkaziladi. Intranazal va sublingual foydalanish uchun eritma tayyorlash: bolalar uchun 3 mg dozasi 1,0 ml (20 tomchi), 6 mg dozasi 2,0 ml (40 tomchi) (bir tomchi (0,05 ml)) eritiladi. tayyorlangan eritmada 0,15 mg preparat mavjud).</p>	2up
-----------------------	-------------------	--	---	---	---	---	---	--	-----

Zamburug'ga karshi vosita	Flukanozol	3mg/kg/sut 1 max 3-5 kun v/i	-	-	+	+	+	3mg/kg/sut 1 max 3-5 kun	3-5 fl
	Vorikanozol	3mg/kg/sut 1 max 3-5 kun v/i	-	-	+	+	+	3mg/kg/sut 1 max 3-5 kun	3-5 fl
Odam IgG	Pentaglobin (og'ir xollarda)	Kam vazndagi tug'ilganda bolalar nizkoy massoy tela pri rojenii - 0.5-1 g/kg interval bilan 1-2 xaf.	-	-	+	+	+	Kam vazndagi tug'ilganda bolalar nizkoy massoy tela pri rojenii - 0.5-1 g/kg interval bilan 1-2 xaf.	5fl
	Bioven Mono (og'ir xollarda)	10% 50ml 0,4-0,8 mg/kg/sut 1 max 3-5 kun 5% 50ml 0,4-0,8 mg/kg/sut 1 max 3-5 kun	-	-	+	+	+	10% 50ml 0,4-0,8 mg/kg/sut 1 max 3-5 kun 5% 50ml 0,4-0,8 mg/kg/sut 1 max 3-5 kun	
	Oktogam (og'ir xollarda)	5-10 %, 50-100 ml 0,4-0,8 mg/kg/sut 1 max 3-5 kun	-	-	+	+	+	5-10 %, 50-100 ml 0,4-0,8 mg/kg/sut 1 max 3-5 kun	
Fibrozga karshi preparat	Longidaza	3 yoshdan. Ampula- 1500ME, 3000ME 1 ampula + 3ml fiz r-r elektroforez 7 minut davomida 6-10 kun, xar 3 oyda.	-	-	+	+	+	Ampula 1500ME, 3000ME 1 ampula + 3ml fiz r-r elektroforez 7 minut davomida 6-10 kun	8up
Kombinirlan gan preparat	Berodual (berotek/atrovent)	1 ml = 20 kapel	-	-	+	+	+	1 ml = 20 kapel	1up
Sekretolitik	0,9% rastvor NaCl	2 ml 2 marta kunda	+	+	+	+	+	2 ml 2 marta kunda	2up
	3% gipertonik eritma va gialuronat natriy - 1,0 mg (Lorde® Gial)	2 ml 2 marta kunda	+	+	+	+	+	2 ml 2 marta kunda	2 up

Mukolitik preparatlar	Atsetilsistein (ATSS)	Og'iz orqali kuniga 2 marta 100 mg yoki kuniga 2 marta 10 ml sirop (kuniga 400-600 mg atsetilsistein). 6 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar: 1 eruvchan tabletka 100 mg dan kuniga 3 marta yoki 2 eruvchan tabletka kuniga 2 marta, 2 yoshdan bolalar.	+	+	+	+	+	Og'iz orqali kuniga 2 marta 100 mg yoki kuniga 2 marta 10 ml sirop (kuniga 400-600 mg atsetilsistein). 6 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar: 1 eruvchan tabletka. 100 mg dan kuniga 3 marta yoki 2 eruvchan tabletka kuniga 2 marta, 2 yoshdan bolalar.	2up
	Ambroksol	Og'iz orqali, 5 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar: bo'lingan dozada kuniga 30-45 mg. 2 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar: bo'lingan dozada kuniga 22,5 mg. 2 yoshgacha bo'lgan bolalar: kuniga 15 mg 2 dozaga bo'lingan.	+	+	+	+	+	Og'iz orqali, 5 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar: 2 bo'lingan dozada kuniga 30-45 mg. 2 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar: 3 bo'lingan dozada kuniga 22,5 mg. 2 yoshgacha bo'lgan bolalar: kuniga 15 mg 2 dozaga bo'lingan.	1up
	Atsetilsistein	Ingalyatsiya 2-3 ml 2 marta kunda	+	+	+	+	+	Ingalyatsiya 2-3 ml 2 marta kunda	2up
	Ambroksol	1-2 ml 2 marta kunda v/i	-	-	+	+	+	1-2 ml 2 marta kunda	14amp
	Standartlangan quruq pechak ekstrakti (5-7,5:1) YEA 575 (Prospan)	Og'iz orqali sirop 7 mg / ml 1 yoshdan - kuniga 2 marta 2,5 ml, 1 yoshdan 6 yoshgacha - kuniga 3 marta 2,5 ml, 6 yoshdan 10 yoshgacha - kuniga 3 marta 5 ml. 20 mg/ml tomchi: 1 yoshdan 4 yoshgacha - kuniga 3 marta 12 tomchi, 4 yoshdan 10 yoshgacha - kuniga 3 marta 16 tomchi, 10 va undan katta yoshdagilar - kuniga 3 marta 24 tomchi. 65 mg	+	+	+	+	+	Og'iz orqali sirop 7 mg / ml: 0 yoshdan 1 yoshgacha - kuniga 2 marta 2,5 ml, 1 yoshdan 6 yoshgacha - kuniga 3 marta 2,5 ml, 6 yoshdan 10 yoshgacha - kuniga 3 marta 5 ml. 20 mg/ml tomchi: 1 yoshdan 4 yoshgacha - kuniga 3 marta 12 tomchi, 4 yoshdan 10 yoshgacha - kuniga 3 marta 16 tomchi, 10 va undan katta yoshdagilar - kuniga 3 marta 24 tomchi. 65 mg	2fl

	tabletkalar: 6 yoshdan 12 yoshgacha - ½ tabletka. Kuniga 2 marta, 12 yoshdan oshgan bolalar - 1 tabletka. ertalab va ½ tab. Kechqurun. 35 mg paketlardagi eritma: 12 yoshdan oshgan bolalar, 1 paket. Kuniga 3 marta, 6 yoshdan 11 yoshgacha boʻlgan bolalar 1 paketdan kuniga 2 marta.						tabletkalar: 6 yoshdan 12 yoshgacha - ½ tabletka. Kuniga 2 marta, 12 yoshdan oshgan bolalar - 1 tabletka. ertalab va ½ tab. Kechqurun. 35 mg paketlardagi eritma: 12 yoshdan oshgan bolalar, 1 paket. Kuniga 3 marta, 6 yoshdan 11 yoshgacha boʻlgan bolalar 1 paketdan kuniga 2 marta.	
Standartlangan quruq pechak ekstrakti (Bronxolisal)	1-3 yosh 10 tomchidan 3-5 maxal, 4-7 yosh 15 tomchidan 3-5 maxal, 7 yoshdan katta 20 tomchidan 3-5 maxal	+	+	+	+	+	1-3 yosh 10 tomchidan 3-5 maxal, 4-7 yosh 15 tomchidan 3-5 maxal, 7 yoshdan katta 20 tomchidan 3-5 maxal	1 fl
Butamirat+ Gvanfenezin	Ichkarida, 7 kg gacha, kuniga 3-4 marta 8 tomchi, - 7-12 kg, kuniga 3-4 marta 9 tomchi, - 12-20 kg, kuniga 3 marta 14 tomchi, - 20-30 kg, kuniga 3-4 marta 14 tomchi, - 30-40 kg, kuniga 3-4 marta 16 tomchi, - 40-50 kg, kuniga 3 marta 25 tomchi, - 50-70 kg, kuniga 3 marta 30 tomchi, - 70 kg dan ortiq, kuniga 3 marta 40 tomchi	+	+	-	-	-	Ichkarida, 7 kg gacha, kuniga 3-4 marta 8 tomchi, - 7-12 kg, kuniga 3-4 marta 9 tomchi, - 12-20 kg, kuniga 3 marta 14 tomchi, - 20-30 kg, kuniga 3-4 marta 14 tomchi, - 30-40 kg, kuniga 3-4 marta 16 tomchi, - 40-50 kg, kuniga 3 marta 25 tomchi, - 50-70 kg, kuniga 3 marta 30 tomchi, - 70 kg dan ortiq, kuniga 3 marta 40 tomchi	2fl
Gvanfenezin+salbutamol+bromgeksin	3 yoshdan ichishga x 3 maxal (5ml); 6 yoshdan ichishga ½-1 tab.x3maxal	+	+	+	+	+	3 yoshdan ichishga x 3 maxal (5ml); 6 yoshdan ichishga ½-1 tab.x3maxal	1up
bradikininga, gistaminga, morfinga	3 yoshdan katta bolalar kuniga 3 marta 1-2 choy qoshiqdan foydalanadilar.	+	+	+	+	+	3 yoshdan katta bolalar kuniga 3 marta 1-2 choy qoshiqdan foydalanadilar.	2up, 2fl

	antitelal, tozalangan	Ovqatdan tashqari kuniga 3 marta 1-2 tabletkadan oling. (to'liq eriguncha og'izda saqlang).						Ovqatdan tashqari kuniga 3 marta 1-2 tabletkadan oling. (to'liq eriguncha og'izda saqlang).	
	Timyan o'ti (Thymiherba), pechak barglari (Hederæ folium)	Og'iz orqali sirop 7 mg / ml: 0 yoshdan 1 yoshgacha - kuniga 2 marta 2,5 ml, 1 yoshdan 6 yoshgacha - kuniga 3 marta 2,5 ml, 6 yoshdan 10 yoshgacha - kuniga 3 marta 5 ml. 20 mg/ml tomchi: 1 yoshdan 4 yoshgacha - kuniga 3 marta 12 tomchi, 4 yoshdan 10 yoshgacha - kuniga 3 marta 16 tomchi, 10 va undan katta yoshdagilar - kuniga 3 marta 24 tomchi. 65 mg tabletkalar: 6 yoshdan 12 yoshgacha - ½ tabletk. Kuniga 2 marta, 12 yoshdan oshgan bolalar - 1 tabletk. ertalab va ½ tab. Kechqurun. 35 mg paketlardagi eritma: 12 yoshdan oshgan bolalar, 1 sashe-paket. Kuniga 3 marta, 6 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalar 1 sashe-paketdan kuniga 2 marta	+	+	-	-	-	Og'iz orqali sirop 7 mg / ml: 0 yoshdan 1 yoshgacha - kuniga 2 marta 2,5 ml, 1 yoshdan 6 yoshgacha - kuniga 3 marta 2,5 ml, 6 yoshdan 10 yoshgacha - kuniga 3 marta 5 ml. 20 mg/ml tomchi: 1 yoshdan 4 yoshgacha - kuniga 3 marta 12 tomchi, 4 yoshdan 10 yoshgacha - kuniga 3 marta 16 tomchi, 10 va undan katta yoshdagilar - kuniga 3 marta 24 tomchi. 65 mg tabletkalar: 6 yoshdan 12 yoshgacha - ½ tabletk. Kuniga 2 marta, 12 yoshdan oshgan bolalar - 1 tabletk. ertalab va ½ tab. Kechqurun. 35 mg paketlardagi eritma: 12 yoshdan oshgan bolalar, 1 sashe-paket. Kuniga 3 marta, 6 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalar 1 sashe-paketdan kuniga 2 marta	2up
Antigistamin dori vositasi	Levotsetirizin	6 yoshdan katta bolalarga 5 mg (1ml-20tomchi) 1 marta sut. 2-6 yosh 2,5 mg/sut (2,5 ml-10 tomchi)	+	+	+	+	+	6 yoshdan katta bolalarga 5 mg (1ml-20tomchi) 1 marta sut. 2-6 yosh 2,5 mg/sut (0,25 ml-5 tomchi)	1 fl
Vitaminlar	Tokoferol atsetat	100 mg	+	+	+	+	+	100 mg	
	Xolekalsiferol	suvli eritma 15000 ME/ml ichishga 1 max	+	+	+	+	+	suvli eritma 15000 ME/ml ichishga 1 max	
	Retinol atsetat	5000 ME, 33000 ME.	+	+	+	+	+	5000 ME, 33000 ME.	

Antipiretik dori	Ibuprofen	6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun peroral buyuriladi bir martalik dozada 5-10 mg/kg;6 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar:1 tabletkadan kuniga 4 martadan ko'p bo'lmagan; 12 yoshdan katta og'iz orqali, kuniga 3-4 marta 200 mg tabletkalarda. Tabletkalarni qabul qilish orasidagi interval kamida 6 soat (kunlik dozasi 30 mg/kg dan oshmasligi kerak)	+	+	+	+	+	20-30 mg/kg dozada kuniga 2 marta – 6 yoshdan katta bolalar va kattalarga; maksimal sutkalik dozasi kattalar uchun 1,2 g; bolalar va o'smirlar uchun 12 dan 17 yoshgacha – 1,0 g ni tashkil qiladi	1up
	Paratsetamol	3 oygacha bo'lgan bolalar uchun peroral buyuriladi bir martalik dozada 10-15 mg/kg, 3 oydan 1 yoshgacha - 60-120 mg, 1-5 yoshda - 120-250 mg, 6-12 yoshli bolalar uchun - 250-500 mg. 6-12 yoshdagi bolalarda rektal foydalanish uchun bir martalik dozalar - 250-500 mg, 1-5 yoshda - 125-250 mg. Foydalanish chastotasi kuniga 4 marta, kamida 4 soatlik interval bilan davolashning maksimal davomiyligi 3 kun.							
Dezintoksikatsion davo	ORSA	Ichish uchun 500ml sutkada	+	+	+	+	+	Ichish uchun 500ml sutkada	1fl
N ⁺ -K ⁺ -ATF –aza ingibitori	Omeprazol	0.7-3.3 mg/kg/sut Yoki 20mg/sut 1 max	+	+	+	+	+	0.7-3.3 mg/kg/sut Yoki 20mg/sut 1 max	1up

Izoh: *SB kechuviga qarab asosiy dorilar ro'yxati Milliy klinik protokollarda keltirilgan dori vositalarga o'zgartirish kiritiladi
-kasallikning asoratlanishi kuzatilsa, asorat turiga qarab dori vositalari korreksiya qilinadi.

Davolash tadbirlari (qo'shimcha medikamentoz davu)		Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulato r yordam		Statsionar yordam				
		O S H P/ O P	K T M P	Tu ma n (sh ah ar) shifoxonala ri	Viloyat darajasid agi tibbiyot muassasa lari	Respublik a darajasid agi tibbiyot muassasa lari		
Vitamin D ₃ Xolekalsiferol (Akvadetrim)	1. Ichishga, 0 – 1 yosh – 1500ME, 1 – 5 yosh -2500ME, ot 6 – 18 yosh 3000ME	+	+	+	+	+	0 – 1 yosh – 1500ME, 1 – 5 yosh -2500ME, ot 6 – 18 yosh 3000ME	1 fl
Sink preparati Immunotsink	2. Ichishga , 1 yoshgacha – 10 mg; 1-6 yosh – 22 mg; 6-10 yosh – 25 mg; 10-16 yosh – 28 mg; 16-18 let – 32 mg.	+	+	+	+	+	1 yoshgacha – 10 mg; 1-6 yosh – 22 mg; 6-10 yosh – 25 mg; 10-16 yosh – 28 mg; 16-18 let – 32 mg.	2up
Enterosorbent terapiya Dioksid kremniy yuqoridisperli+ Laktuloza	... 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar: kuniga 1 marta 1 sashe-paket; 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar: kuniga 2 marta 1 sashe-paket; 12 yoshdan oshgan bolalar va kattalar: kuniga 3 marta 1 sashe-paket. Mahsulotning tayyorlangan suvli suspenziyasi ovqatdan yoki dori-darmonlardan 1 soat oldin og'iz orqali olinadi.	+	+	+	+	+	3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar: kuniga 1 marta 1 sashe-paket; 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar: kuniga 2 marta 1 sashe-paket; 12 yoshdan oshgan bolalar va kattalar: kuniga 3 marta 1 sashe-paket. Mahsulotning tayyorlangan suvli suspenziyasi ovqatdan yoki dori-darmonlardan 1 soat oldin og'iz orqali	2up

							olinadi.	
Probulard Bioterol	4 yoshdan 6 yoshgacha - kuniga 1 marta 1 kapsuladan; - 6 yoshdan va kattalar - kuniga 2 marta 1 kapsuladan. Qo'llash bo'yicha ko'rsatmalar: 6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun kapsulaning tarkibini bir stakan suyuqlikka (xona haroratiga qadar sovutilgan qaynatilgan suv, bolalar ovqati) bir martalik dozada quyung.	+	+	+	+	+	4 yoshdan 6 yoshgacha - kuniga 1 marta 1 kapsuladan; - 6 yoshdan va kattalar - kuniga 2 marta 1 kapsuladan. Qo'llash bo'yicha ko'rsatmalar: 6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun kapsulaning tarkibini bir stakan suyuqlikka (xona haroratiga qadar sovutilgan qaynatilgan suv, bolalar ovqati) bir martalik dozada quyung.	2up
Galavit	Fl. 50mg/sut m/o, Rektal 50mg/sut, Ichishga 50mg tab 1 max 10-15 kun	+	+	+	+	+	Fl. 50mg/sut m/o, Rektal 50mg/sut, Ichishga 50mg tab 1 max 10-15 kun	10-15fl
Polioksidoniy	3-6mg/sut v/i, m/o 1 max 10 kun	-	-	+	+	+	3-6mg/sut v/i, m/o 1 max 10 kun	10 fl
Askoril	Tab. 12 yoshdan 1 tab 3 max 10 kun, 6-12 yosh ½ tab 3 max 10 kun Sirop 6-12 yosh 5-10 ml 3 max 10 kun	+	+	+	+	+		
Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq) SB kechuviga qarab qo'shimcha dorilar ro'yxati Milliy klinik protokollarda keltirilgan dori vositalarga o'zgartirish kiritiladi; - kasallik asoratlanishi kuzatilsa, asorat turiga qarab dori vositalari korreksiya qilinadi.								

(REJALI JARROHLIK AMALIYOTI)

Davolash tadbirlari (operativ davo)	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha				
	Ambulator yordam		Statsionar yordam		
Jarrohlik amaliyoti/aralashuv/muolaja nomi	OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari
2. Bronxoalveolyar lavaj	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi
3. Bronxoskopiya	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi
...					

Izoh:* jarroxlik amaliyotini o'tkazish uchun sharoit mavjud bo'lgan xususiy statsionarda o'tkazilishi talab qilinadi;

(DAVOLOVCHI OVQATLANISH/PARHEZ)

Ovqatlanish tartibi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha				
	Ambulator yordam		Statsionar yordam		
Parhez stoli va uning davomiyligi	OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari
1. Parhez (stol №1A keyinchalik 1B stoli)	OSH	1. OSH 2. Pediater	1. Pediater 2. Pulmonolog 3. Kardiolog 4. Lor	1. Pediater 2. Pulmonolog 3. Kardiolog 4. Lor	1. Pediater 2. Pulmonolog 3. Kardiolog 4. Lor
fizioterapiya	1. OSH 2. Pediater	1. OSH 2. Pediater	1. Pediater 2. Gastroenterolog 3. Fizioterapiya shifokori	1. Pediater 2. Gastroenterolog 3. Fizioterapiya shifokori	1. Pediater 2. Gastroenterolog 3. Fizioterapiya shifokori

SURUNKALI BRONXIT NOZOLOGIYA BO'YICHA TEZ VA SHOSHILINCH TIBBIY YORDAM KO'RSATISH HOLATLARDA

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Tez va shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam*				
		TTYO/ uy sharoitida	OP/ OSHP / KTMP	Tumanlararo shoshilinch yordam markazi	Viloyat shoshilinch tez tibbiy yordam IATM filiali	Respublika shoshilinch va tez tibbiy yordam IAT markazi		
Asosiy mutaxassis (shifokor) maslahati	1.							
	2.							
	...							
Izoh:								
Mutaxassis (shifokor) maslahati (qo'shimcha)	1.							
	2.							
	...							
Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)								
Asosiy laborator tekshiruvlar	1.							
	2.							
	...							
Izoh:								
Qo'shimcha laborator tekshiruvlar	1.							
	2.							
	...							
Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)								
Asosiy instrumental tekshiruvlar	1.							
	2.							
	...							
Izoh:								
Qo'shimcha instrumental tekshiruvlar	1.							
	2.							
	...							
Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)								

*SHOSHILINCH STATSIONAR DAVOGA KO'RSATMA: (bu yerga ambulator davo jarayonida paydo bo'ladigan statsionar davoga ko'rsatmalar yoziladi)

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Tez va shoshilinch yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam*				
		TTYO/ uy sharoitida	OP/ OSHP / KTMP	Tumanlararo shoshilinch yordam markazi	Viloyat shoshilinch tez tibbiy yordam IIATM filiali	Respublika shoshilinch va tez tibbiy yordam IIAT markazi		
Boshqa turdagi tekshiruvlar	1.							
	2.							
	...							

Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)

(MEDIKAMENTOZ DAVO)

Davolash tadbirlari (asosiy medikamentoz davo)		Tez va shoshilinch yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi	Ambulator yordam		Statsionar yordam*				
		TTYO/ uy sharoitida	OP/ OSHP / KTMP	Tumanlararo shoshilinch yordam markazi	Viloyat shoshilinch tez tibbiy yordam IIATM filiali	Respublika shoshilinch va tez tibbiy yordam IIAT markazi		
1.								
2.								
...								

Izoh:

Davolash tadbirlari (qo'shimcha medikamentoz davo)		Tez va shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi	Ambulator yordam		Statsionar yordam*				
		TTYO/ uy sharoitida	OP/ OSHP / KTMP	Tumanlararo shoshilinch yordam markazi	Viloyat shoshilinch tez tibbiy yordam IIATM filiali	Respublika shoshilinch va tez tibbiy yordam IIAT markazi		
1.	1.							
2.	2.							
...	...							

Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)

(TEZ VA SHOSHILINCH JARROHLIK AMALIYOTI)

Davolash tadbirlari (operativ davo)	Tez va shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha				
	Ambulator yordam		Statsionar yordam*		
	TTYO/ uy sharoitida	OP/ OSHP/ KTMP	Tumanlararo shoshilinch yordam markazi	Viloyat shoshilinch tez tibbiy yordam IIATM filiali	Respublika shoshilinch va tez tibbiy yordam IIAT markazi
Jarrohlik amaliyoti/aralashuv/muolaja nomi					
1.					
2.					
...					
Izoh: (bu yerga jarrohlik amaliyoti/aralashuv/muolajani o'tkazish uchun ko'rsatma keltiriladi)					

(DAVOLOVCHI OVQATLANISH/PARHEZ)

Ovqatlanish tartibi	Tez va shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha				
	Ambulator yordam		Statsionar yordam*		
	TTYO/ uy sharoitida	OP/ OSHP / KTMP	Tumanlararo shoshilinch yordam markazi	Viloyat shoshilinch tez tibbiy yordam IIATM filiali	Respublika shoshilinch va tez tibbiy yordam IIAT markazi
Parhez stoli va uning davomiyligi					
Izoh: (Statsionardan chiqishga ko'rsatma/ rejali shifoxonaga o'tkazishga ko'rsatma to'liq yozilishi kerak)					

(DISPANSERIZATSIYA)

(SOG'LOM KONTINGENT DISPANSERIZATSIYASI/"D" NAZORATGA OLINGAN BEMOR DISPANSERIZATSIYASI)

Dispanserizatsiya tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	OSHP/OP	KTMP	Tadbirlar minimal soni	Dispanser nazorati muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati	1. Shifokorning klinik va fizikal tekshiruvlari			1. Birlamchi shifoxonada davolanib chiqqandan so'ng 1-3 oy davomida shifokor nazorati; 2. 1-chi yil har 3 oyda, keyingi yillar yilda 2 marta (baxor va kuzda) "D" nazorati o'tkaziladi; 3. Yilda 2 martava ko'rsatmaga muvofiq klinik, fizikal, laborator, tekshiruvlarni o'tkazish; 4. Yilda 1 marta instrumental MSKT o'tkaziladi; 5. Ko'rsatmaga muvofiq boshqa tor mutaxassislar ko'ruvi va qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazish; 6. Kasallik retsidivi yoki asoratlangan holatida yo'llanma asosida statsionar davoga yuborish.	"D" nazoratda turgan bolalarda kasallik xuruji kuzatilganida yilda kamida 1 marta statsionar davo o'tkazish; kasallik asoratlanishi kuzatilganida RISHTYOIATM va RIPIATM va ularning viloyat filiallarida jarrohlik amaliyotini o'tkazish
	2.				
	...				
Izoh:					

Laborator tekshiruvlar	1.				
	2.				
	...				

Izoh:

Instrumental tekshiruvlar	1.				
	2.				
	...				

Izoh:

(BIRLAMCHI, IKKILAMCHI VA UCHLAMCHI PROFILAKTIKA/ SKRINING)

Profilaktika tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	OSHP/OP	KTMP	Tadbirlar minimal soni	Reabilitatsiya muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati	1.				
	2.				
	...				
Izoh:					
Laborator tekshiruvlar	1.				
	2.				
	...				
Izoh:					
Instrumental tekshiruvlar	1.				
	2.				
	...				
Izoh:					
Profilaktika usullar	1.				
	2.				
	...				
Izoh:					
Davolash tadbirlari (nomedikamentoz davo)		OSHP/OP	KTMP	O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
Profilaktik fito/dori vositalarining (xalqaro patentlanmagan) nomi	Profilaktik fito/dori vositalari dozirovkasi va qo'llanilishi				
1.					
2.					
...					
Izoh:					

(REABILITATSIYA)

Reabilitatsiya tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	Uy sharoitida	OSHP/OP / KTMP	Statsionar sharoitida	Tadbirlar minimal soni	Reabilitatsiya muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati	1.Pediatr	-	+	+	Xar kvartalda	
	2.Pulmonolog	-	+	+	Xar kvartalda	
	...					
Izoh:						
Laborator tekshiruvlar	1.					
	2.					
	...					
Izoh:						
Instrumental tekshiruvlar	1.					
	2.					
	...					
Izoh:						
*Bu yerga nozologiya bo'yicha bemorlarni uy/poliklinikv/statsionar sharoitida o'tkazilishi kerak bo'lgan reabilitatsiyaga ko'rsatmalar kiritilishi kerak						
Reabilitatsion usullar	1.					
	2.					
	...					
Izoh:						
Davolash tadbirlari (medikamentoz davo)		Uy sharoitida	OSHP/OP / KTMP	Statsionar sharoitida	O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi					
1.						
2.						
...						
Izoh:						

(PALLIATIV DAVO)

Palliativ tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	Uy sharoitida	OSHP/OP / KTMP	Statsionar sharoitida	Tadbirlar minimal soni	Reabilitatsiya muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati	1.					
	2.					
	...					
Izoh:						
Laborator tekshiruvlar	1.					
	2.					
	...					
Izoh:						
Instrumental tekshiruvlar	1.					
	2.					
	...					
Izoh:						
*Bu yerga nozologiya bo'yicha bemorlarni uy/poliklinikv/statsionar sharoitida o'tkazilishi kerak bo'lgan palliativ davoga ko'rsatmalar kiritilishi kerak						
Palliativ davo usullar	1.					
	2.					
	...					
Izoh:						
Davolash tadbirlari (medikamentoz/nomedikamentoz davo)		Uy sharoitida	OSHP/OP / KTMP	Statsionar sharoitida	O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
Dori-vositasi/fito-preparatning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositasi/fito- preparatning dozirovkasi va qo'llanilishi					
1.						
2.						
...						
Izoh:						