

O'zbekiston Respublikasi
Sog'liqni saqlash vazirining
2025 yil "23" iyundagi
180-sonli buyrug'iga
ilova

**MUKOVISSIDOZ NOZOLOGIYASI BO YICHA TIBBIY XIZMAT
KO RSATISH MILLIY KLINIK STANDARTI**



“TASDIQLAYMAN”

O'ZRSSV RIPIATM direktori

A.A. Abdukayumov

” _____ 2025-yil

**MUKOVISSIDOZ NOZOLOGIYASI BO‘YICHA TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH MILLIY KLINIK
STANDARTI**

Toshkent 2025

MUKOVISSIDOZ (nozologiya nomi) NOZOLOGIYASI BO'YICHA TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH MILLIY KLINIK

STANDARTI

MILLIY KLINIK STANDART NOZOLOGIYASINING NOMI (KODI), TASHXISLASH VA DAVOLASHGA JALB ETILADIGAN MUTAXASSISLAR NOMI

XKT-10/11 bo'yicha kodlanishi:	Nozologik nomlanishi:	Nozologiya bo'yicha ambulatoriya sharoitida tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar		Nozologiya bo'yicha statsionar sharoitda tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar	
		Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo'shimcha jalb etiladigan mutaxassislar	Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo'shimcha jalb etiladigan mutaxassislar
E84.0 E84.8 E84.9	O'pka ko'rinishlariga ega bo'lgan kistozli fibroz Boshqa ko'rinishlarga ega bo'lgan kistozli fibroz Aniqlanmagan kistozli fibroz	1. OSH 2. Pediatr	1.Lor 2. Kardiolog 3. Nevropotolog 4. Gepatolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Gastroenterolog	3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6. Gepatolog
MKB-11 CA25.1 CA25.2 CA25 CA25.0 CA25.Z	Atipik kistozli fibroz Subklinik kistozli fibroz kistozli fibroz Klassik kistozli fibroz aniqlanmagan kistozli fibroz				

***standartni to'ldirish jarayonida nozologiya, uning kattalar, xomiladorlar, bolalar va qariyalarda kechuvi hamda nozologiya bo'yicha kasallikni davri xususiyatidan kelib chiqish talab etiladi. Shuningdek, nozologiya ga to'g'ri kelmaydigan jadvallarni to'ldirish tavsiya qilinmaydi. (Misol uchun, jarroxlik amaliyoti nozologiyasida o'tkazilmasa (JARROHLIK AMALIYOTI) jadvali to'ldirilmaydi yoki nozologiyada palliativ davo ko'zda tutilmasa – (PALLIATIV DAVO) jadvali to'ldirilmaydi.**

MUKOVISSIDUZ NOZOLOGIYA BO'YICHA REJALI TASHXISLASH, DAVOLASH, REABILITATSIYA VA DISPANSERIZATSIYA TADBIRLARI

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Asosiy mutaxassis (shifokor) maslahati	Shikoyati va anamnez (kasallik va hayot anamnezi)	1. OSH 2. Pediatr	1. OSH 2. Pediatr	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6. Gastroenterolog 7. Gepatolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6. Gastroenterolog 7. Gepatolog 8. Torakal jarrox	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6. Gastroenterolog 7. Gepatolog 8. Torakal jarrox	Tibbiy ko'rik davrida yilda kamida 2-marta; – Kasallik bo'yicha murojaat bo'lganida 2-marta va ko'rsatma bo'lganida	- Kasallik bo'yicha murojaat bo'lganida 1-marta va ko'rsatma bo'lganida to'liq ko'ruvni o'tkazadi
	Obyektiv ko'rik	1. OSH 2. Pediatr	1. OSH 2. Pediatr	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6. Gastroenterolog 7. Gepatolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6. Gastroenterolog 7. Gepatolog 8. Torakal jarrox	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6. Gastroenterolog 7. Gepatolog 8. Torakal jarrox	Tibbiy ko'rik davrida yilda kamida 2-marta; – Kasallik bo'yicha murojaat bo'lganida 2-marta va ko'rsatma bo'lganida	- bo'yicha murojaat bo'lganida 1-marta va ko'rsatma bo'lganida to'liq ko'ruvni o'tkazadi
	Fizikal va klinik tekshiruv	1. OSH 2. Pediatr	1. OSH 2. Pediatr	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6. Gastroenterolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6. Gastroenterolog 7. Gepatolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6. Gastroenterolog	Tibbiy ko'rik davrida yilda kamida 2-marta; – Kasallik bo'yicha	- bo'yicha murojaat bo'lganida 1-marta va ko'rsatma bo'lganida to'liq

				7. Gepatolog	8. Torakal jarrox	7.Gepatolog 8. Torakal jarrox	murojaat bo'lganida 2-marta va ko'rsatma bo'lganida	ko'ruvni o'tkazadi
Izoh:								
Mutaxassis (shifokor) maslahati (qo'shimcha)	1. Tibbiy ko'rik (havf omillarini aniqlash)			1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6. Gastroenterolog 7. Gepatolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6. Gastroenterolog 7. Gepatolog 8. Torakal jarrox	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6. Gastroenterolog 7.Gepatolog 8. Torakal jarrox	Tibbiy ko'rik davrida yilda kamida 2-marta; – Kasallik bo'yicha murojaat bo'lganida 2-marta va ko'rsatma bo'lganida	Davolash davomiyligi: havf omili aniqlanmaganida: 21 kun; havf omili aniqlanganda: holati yaxshilangunga qadar - Murojaat qilganda havf omilini aniqlash; - statsionarda davolash tavsiyasi beriladi; - shifoxonadan chiqishda ambulator nazorat uchun tavsiyalar beriladi.
	2. Havf omillarini bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar	1. OSH 2. Pediatr	1. OSH 2. Pediatr	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6.	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6. Gastroenterolog	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6.	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Lor 4. Kardiolog 5. Nevropotolog 6.	Davolash davomiyligi: havf omili aniqlanmaganida: 3-5 kun; havf omili

				Gastroenterolog 7. Gepatolog 8. Torakal jarrox	7. Gepatolog 8. Torakal jarrox	Gastroenterolog 7. Gepatolog		aniqlanganda : holati yaxshilangun ga qadar- Murojaat qilganda havf omilini aniqlash; - statsionarda davolash tavsiyasi beriladi; - shifoxonadan chiqishda ambulator nazorat uchun tavsiyalar beriladi.
	...							

Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq) bemorda qo'shimcha boshqa yoki yondosh kasalliklari aniqlangan holatda, ko'rsatmaga muvofiq **Milliy klinik protokollarda keltirilgan** boshqa tegishli tor doirasidagi mutaxassislarning ko'rigi o'tkazilishi talab etiladi;
- kasallikni asoratlangan holatida murojaat bo'lsa va/yoki aniqlansa, shuningdek jarrohlik amaliyotiga ko'rsatma bo'lgan holatlarda **shoshilinch jarrox konsultatsiyasi** o'tkaziladi, bemor holatiga qarab shifoxonaga statsionar davoga va/yoki jarroxlik amaliyotini o'tkazish uchun yo'naltiriladi.

Asosiy laborator tekshiruvlar	Asosiy: 1. Qonning umumiy (klinik) tahlili	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		- Kasallik bo'yicha murojaat bo'lganida 1-marta va/yoki ko'rsatmaga muvofiq
	2. Siydikning umumiy (klinik) tahlili	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		
	3. Balg'amning bakteriologik ekmasi	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	
4. Umumiy bioximik qon taxlili, S reaktiv oksili va, koagulogramma aniqlash uchun tekshiruv	bajariladi	kullaniladi	kullaniladi	kullaniladi	kullaniladi	kullaniladi		
5. Prokalsitonin	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		
6. Tomoqdan surtma	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		

	7. Qon guruxini aniqlash	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		
	8. KIX (kislota-ishqor xolati)	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		
	9. Qonda amilazani aniqlash	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		
	10. Pankreatik amilazani aniqlash	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		
	11. Kislorod saturatsiyasini aniqlash	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		

Izoh: birlamchi murojaat qilingan shifokor tomonidan laborator tekshiruvlarni o'tkazilishi talab etiladi, keyingi darajaga tor mutaxassislar ko'ruviga shu taxlillar natijalari yo'naltiriladi. Laborator tekshiruvni takroriy o'tkazilishi, tor mutaxassis yoki statsionar davolanish jarayonida ko'rsatma bo'lganidagina o'tkaziladi.

Qo'shimcha laborator tekshiruvlar	Qo'shimcha: Bemorni konsultatsiya qilishda yondosh kasalliklari aniqlanganda, tibbiyot muassasalari darajasidan kelib chiqib mavjud laborator tekshiruvlari o'tkaziladi.							
	1. Diaskin test	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi		
	2. Qonda D-Dimer aniklash	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajariladi		
	3. Ichak mikrobiotasini tekshirish							

Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)

Asosiy instrumental tekshiruvlar	1. Asosiy: 1. Ko`krak q`afasi rentgen. Ko`rsatmaga ko`ra MSKT	qo'llanilmaydi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		- Kasallik bo'yicha murojaat bo'lganida 1-marta va/yoki ko'rsatmaga muvofiq
	2.EKG	qo'llanilmaydi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		
	3. Qorin bo'shlig'i a'zolari UTT	qo'llanilmaydi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		
	4. Spirografiya	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		
	5. Axlatda elastazani aniqlash	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi	bajariladi	bajariladi		

Izoh: instrumental diagnostik tekshiruvlar birlamchi murojaat qilingan shifokor tomonidan o'tkaziladi.

Agarda, boshqa darajadagi tibbiyot muassasasida davolanishga ko'rsatma paydo bo'lsa, shu o'tkazilgan tekshiruv nusxalari bilan yo'naltiriladi.

Instrumental diagnostik tekshiruvni takroriy o'tkazilishi, tor mutaxassis yoki statsionar davolanish jarayonida ko'rsatma bo'lganidagina o'tkaziladi.

Qo'shimcha	1. Bemorni konsultatsiya qilishda yondosh							
-------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

instrumental tekshiruvlar	kasalliklari aniqlanganda, tibbiyot muassasalari darajasidan kelib chiqib mavjud instrumental diagnostik tekshiruvlari o'tkaziladi.							

Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)

***STATSIONAR DAVOGA KO'RSATMA: (bu yerga ambulator davo jarayonida paydo bo'ladigan statsionar davoga ko'rsatmalar yoziladi)**

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Boshqa turdagi tekshiruvlar	1.							
	2.							
	...							
Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)								

(MEDIKAMENTOZ DAVO)

Davolash tadbirlari (asosiy medikamentoz davo)		Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka	
		Ambulator yordam		Statsionar yordam					
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi	OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari			
Aminopenitsillin	Amoksitsillin	ichishga, 100-150 mg/kg/sut, 2-3 marta/sut	+	+	-	-	-	100-150 mg/kg/sut, 2-3 marta/sut	2up
	Amoksitsillin/klavulanat	ichishga, 100-150 mg/kg/sut, 2-3 marta/sut	+	+	-	-	-	100-150 mg/kg/sut, 2-3 marta/sut	2up
	Amoksitsillin/sulbaktam	ichishga, 100-150 mg/kg/sut, 2-3 marta/sut	+	+	-	-	-	100-150 mg/kg/sut, 2-3 marta/sut	2up
	Sultamitsillin	ichishga, 50-100 mg/kg/sut, 2-3 marta/sut	+	+	-	-	-	50-100 mg/kg/sut, 2-3 marta/sut	2up

	Benzil-penitsillin	V/i, m/o, 1,0-5,0 Yed/kg/sut, 4-6 mar/sut	+	+	+	+	+	V/i, m/o, 1,0-5,0 Yed/kg/sut, 4-6 mar/sut	14fl
	Ampitsillin	V/i, m/o, 200-400 mg/kg/sut, 4 mar/sut	+	+	+	+	+	V/i, m/o, 200-400 mg/kg/sut, 4 mar/sut	14fl
	Oksatsillin	V/i, m/o 300-450 mg/kg/sut, 4-6 mar/sut	+	+	+	+	+	V/i, m/o 300-450 mg/kg/sut, 4-6 mar/sut	14fl
	Amoksitsillin/ klavulanat	V/i, m/o, 3 oylikdan - 80 mg/kg (kg <4 kg) yoki 100 mg/kg (vazn > 4 kg), keyin 3 oy , 3-4 mar/sut	+	+	+	+	+	V/i, m/o, 3 oylikdan - 80 mg/kg (kg <4 kg) yoki 100 mg/kg (vazn > 4 kg), keyin 3 oy , 3-4 mar/sut	14fl
	Amoksitsillin/ sulbaktam	V/i, m/o, 2 yoshgacha – 100-150 mg/kg/sut, 2-6 yosh – 750 mg, 6-12 yosh – 1,5 g, 12 yoshdan keyin – 2-3 g , 2-3 mar/sut	+	+	+	+	+	V/i, m/o, 2 yoshgacha – 100-150 mg/kg/sut, 2-6 yosh – 750 mg, 6-12 yosh – 1,5 g, 12 yoshdan keyin – 2-3 g , 2-3 mar/sut	14fl
	Ampitsillin/ sultaktam	V/i, m/o 150 mg/kg/sut, 3-4 mar/sut	+	+	+	+	+	V/i, m/o 150 mg/kg/sut, 3-4 mar/sut	14fl
Sefalosporin -2	Sefuroksim	ichishga, 20-30mg/kg (500 mg/sut, 2 marta /sut ko'rsatmaga ko'ra	+	+	+	+	+	ichishga, 20-30mg/kg (500 mg/sut, 2 marta /sut ko'rsatmaga ko'ra	1up
	Sefaklor	ichishga, 20-40 mg/kg (1500 mg/sutkup bo'lmagan, 2-3 marta /sut ko'rsatmaga ko'ra	+	+	+	+	+	ichishga, 20-40 mg/kg (1500 mg/sutkup bo'lmagan, 2-3-marta /sut ko'rsatmaga ko'ra	2up
	Sefuroksim	V/i, m/o 30-100 mg/kg/sut, 2 mar/sut	-	-	+	+	+	V/i, m/o 30-100 mg/kg/sut, 2 mar/sut	14fl

Sefalosporin -3	Sefotaksim	V/i, m/o 100-150 mg/kg/sut, 2 mar/sut	-	-	+	+	+	V/i, m/o 100-150 mg/kg/sut, 2 mar/sut	14fl
	Seftriakson	V/i, m/o 50-100 mg/kg /sut, 1-2 mar/sut	-	-	+	+	+	V/i, m/o 50-100 mg/kg /sut, 1-2 mar/sut	14fl
	Seftazidim	V/i, m/o 100-150 mg/kg (6 g ko'p emas), 2 oylikgacha - 25-60 mg/kg/sut, 2 m/sut	-	-	+	+	+	V/i, m/o 100-150 mg/kg (6 g ko'p emas), 2 oylikgacha - 25-60 mg/kg/sut, 2 m/sut	14fl
	Sefoperazon	V/i, m/o 100-200 mg/kg/sut, 2m/sut	-	-	+	+	+	V/i, m/o 100-200 mg/kg/sut, 2 m/sut	14fl
IZSS-3	Sefoperazon/sulbaktam	V/i, m/o 100-160 mg/kg/sut, 2 m/sut	-	-	+	+	+	V/i, m/o 100-160 mg/kg/sut, 2m/sut	14fl
	Sefotaksim/sulbaktam	V/i, m/o 100-160 mg/kg/sut, 2 marta	-	-	+	+	+	V/i, m/o 100-160 mg/kg/sut, 2marta	14fl
SS-4	Sefepim	V/i, m/o 100-150 mg/kg/sut, 2marta	-	-	+	+	+	V/i, m/o 100-150 mg/kg/sut, 2marta	14fl
IZSS-4	Sefipim/sulbaktam	V/i, m/o 100-150 mg/kg (sefipimga) /sut, 2 marta	-	-	+	+	+	V/i, m/o 100-150 mg/kg (sefipimga) /sut, 2 marta	14fl
Karbapenem	Imipenem	V/i, m/o V/i- 60 mg/kg, m\o – 1-1,5 g/sut, 3 mart	-	-	+	+	+	V/i, m/o V/i- 60 mg/kg, m\o – 1-1,5 g/sut, 3 mart	30 fl
	Meropenem	V/i, 30-60 mg/kg/sut, 2-3 marta/sut, 2-3 marta	-	-	+	+	+	V/i, 30-60 mg/kg/sut, 2-3 marta/sut, 2-3 marta	30fl

	Ertapenem	V/i, m/o 30 mg/kg (1 g dan ko'p)	-	-	+	+	+	V/i, m/o 30 mg/kg (1 g dan ko'p)	30fl
Aminoglikozid	Amikatsin	V/i, m/o 10-20 mg/kg/sut, 1-2 marta	-	-	+	+	+	V/i, m/o 10-20 mg/kg/sut, 1-2 marta	14fl
	Gentamitsin	V/i, m/o 3-5 mg/kg/sut, 1-2 max 8-12 mg/kg 2 max ingalyatsiya	-	-	+	+	+	V/i, m/o 3-5 mg/kg/sut, 1-2 max 8-12 mg/kg 2 max ingalyatsiya	14fl
	Netilmitsin	V/i, m/o 4-6,5 mg/kg/sut, 1-2 max	-	-	+	+	+	V/i, m/o 4-6,5 mg/kg/sut, 1-2 max	14fl
	Tobramitsin	V/i, m/o 3-5 mg/kg/sut, 1-2 raza 300 mg/5ml ingalyatsiya 2 max	-	-	+	+	+	V/i, m/o 3-5 mg/kg/sut, 1-2 max 300 mg/5ml ingalyatsiya 2 max	14fl
	Piperatsillin \tazabaktam	90 mg\kg kuniga V/i	-	-	+	+	+	90 mg/kg kuniga V/i 2 max 14 kun	28 fl
	Tikarsillin/klavulanat	80-200 mg\kg kuniga	-	-	+	+	+	80-200 mg/kg kuniga	14fl
Makrolidlar	Azitromitsin	ichishga, 10 mg/kg/sut, sutkada 1 marta	+	+	+	+	+	ichishga, 10 mg/kg/sut, sutkada 1 marta	1 up
	Azitromitsin	V/i, 10 mg/kg (500 mgdan ko'p emas)* /sut, 1 marta	+	+	+	+	+	V/i, 10 mg/kg (500 mgdan ko'p emas)* /sut, 1 marta	7fl
	Azitromitsin	Tilarang staf. va ko'k yiring tayokchasi aniklangan xolatlarda	+	+	+	+	+	Tilarang staf. va kuk yiring tayokchasi aniklangan xolatlarda 10 mg/kg/sut	

		10 mg/kg/sut xaftada 3-marta 1 max 3 oy, so`ng 1 oy tanaffus va yana 3 oy 10 mg/kg/sut buyuriladi, doimiy						xaftada 3-marta 1 max 3 oy, sung 1 oy tanaffus va yana 3 oy 10 mg/kg/sut buyuriladi, doimiy.	
	Klaritromitsin (Klatsid)	ichishga, 15 mg/kg/sut (500 mg dan kam emas) , 1-2-marta/sut	+	+	+	+	+	ichishga, 15 mg/kg/sut (500 mg dan kam emas) , 1-2 marta/sut	1up
	Roksitromitsin	ichishga, 5-8 mg/kg/sut (300 mg ko`p emas), 2 marta/sut	+	+	+	+	+	ichishga, 5-8 mg/kg/sut (300 mg ko`p emas), 2 marta/sut	1up
	Djozamitsin	ichishga, 40-50 mg/kg/sut, 2-3 mart /sut	-	-	+	+	+	ichishga, 40-50 mg/kg/sut, 2-3 mart /sut	1up
	Midekamitsin	ichishga, 20-50 mg/kg/sut, 2-3 marta/sut	-	-	+	+	+	ichishga, 20-50 mg/kg/sut, 2-3 marta/sut	1up
	Spiramitsin	ichishga, 150000-300000 ME/kg/sut, 2-3 mar /sut	-	-	+	+	+	ichishga, 150000-300000 ME/kg/sut, 2-3 mar /sut	1up
	Klindamitsin	ichishga, 8-25 mg/kg/sut, 2-3 mart /sut	-	-	+	+	+	ichishga, 8-25 mg/kg/sut, 2-3 mart /sut	1up
Linkozamid	Linkamitsin	V/i, m/o 10-20 mg/kg/sut, 2 mart	-	-	+	+	+	V/i, m/o 10-20 mg/kg/sut, 2 mart	14fl
	Klindamitsin	V/i, m/o 20-40 mg/kg/sut,3-4 mart	-	-	+	+	+	V/i, m/o 20-40 mg/kg/sut,3-4 mart	14fl

Boshqa antibiotik J01XX01	Fosfomitsin neo	V/i 100-200 mg/kg./sut, 1-2 mart	-	-	+	+	+	V/i 100-200 mg/kg./sut, 1-2 mart	14fl
	Fluimutsil	Ingalyatsiya uchun 300 mg 2 max	-	-	+	+	+	Ingalyatsiya uchun 2 max	
	Kolistimetat natriya	Ingalyatsiya uchun 1-4 mln YED kuk yiring tayoqchasi aniqlangan xolda doimiy 2 max	+	+	+	+	+	Ingalyatsiya uchun 1-4 mln YED kuk yiring tayoqchasi aniqlangan xolda doimiy 2 max	
Ftorxinolonlar	Siprofloksatsin	15-20mg/kg/sut 2 max v/i 7-10 kun	+	+	+	+	+	15-20mg/kg/sut 2 max v/i 7-10 kun	
	Doksitsiklin (12 yoshdan katta)	100-200 mg ichishga 1 max	-	-	+	+	+	100-200 mg ichishga 1 max	
Glikopeptid A07AA09	Vankomitsin	V/i, 40 mg/kg/sut, 3 mart	-	-	-	+	+	V/i, 40 mg/kg/sut, 3 mart	21fl
Oksazolidinon J01XX08	Linezolid	V/i, 20 mg/kg/sut, 2-mart	-	-	-	+	+	V/i, 20 mg/kg/sut, 2-mart	14fl
β2-Agonist	Fenoterol	0,5–0,75 mg (10–15 kapel)	+	+	+	+	+	0,5–0,75 mg (10–15 kapel)	1fl
	Salbutamol (Nebutamol)	Sprey 1–2,5 mg (1–2,5 ml)	+	+	+	+	+	1–2,5 mg (1–2,5 ml)	1fl
Antixolinergik	Ipratropiumbromid (atrovent)	Sprey 0,25 mg (1 ml)	+	+	+	+	+	0,25 mg (1 ml)	1fl

Fosfolipidlar-gepatoprotektorlar	Essensial-Fosfolipidlar	300-400 mg kaps.ichishga,v/i	+	+	+	+	+	300-400 mg kaps.ichishga,v/i	
Steroid	Beklometazon di-propionat (beklazon)	Sprey 400–800 mkg/sut	+	+	+	+	+	400–800 mkg/sut	1fl
	Budesonid (pulmikort, benakort)	Ingalyatsiya 400–800 mkg/sut	+	+	+	+	+	0,25 mg/ml, ingalyatsiya uchun dozali kukun 100 mkg/doza	14fl
	Prednizolon	1 (1-2) mg/kg haqiqiy vazn hisobidan, 15-20 kun ichishga; kamaytirish tezligi dastlabki doza bilan aniqlanadi: 15 mg/sut va undan ko'p bo'lsa, har 3-4 kunda 1-1,25 mgga kamaytiriladi; 15-10 mg/sut da har 5-7 kunda 1-1,25 mgga kamaytiriladi; davolanish uzoq davom etishi talab qilinganda	-	-	+	+	+	1 (1-2) mg/kg 15-20 kun ichishga	
Virus qarshi preparat	rekombinantlangan odam interferon alfa-2b	Rektal 7 yoshdan kattabolalarga, — 500000 ME 1 supp. Dan. 2 marta sutkada 12soatda 5 kun xar kuni. 7 yoshgacha bolalarga, 150000 ME	-	-	-	+	+	Rektal 7 yoshdan kattabolalarga, —500000 ME 1 supp. Dan. 2 marta sutkada 12soatda 5 kun xar kuni. 7 yoshgacha bolalarga, 150000 ME 1 supp. Dan. 2 marta sutkada 12soatda 5 kun xar kuni.	2 up

		1 supp. Dan. 2 marta sutkada 12soatda 5 kun xar kuni.							
Virus qarshi preparat L03AB05	interferon gammaga antitela, CD 4 ga antitela, gistaminga antitela	1 oylik va undan katta yoshdagi bolalar. Davolashning 1-kunida quyidagi sxema bo'yicha 8 tabletkadan oling: Birinchi 2 soatda har 30 daqiqada 1 tabletkadan (2 soat ichida jami 5 tabletka), so'ngra o'sha kun davomida yana 1 tabletkadan 3-marta teng vaqt oralig'ida oling. 2-kuni va undan keyin to'liq tiklanishigacha kuniga 3-marta 1 tabletkadan oling.	+	+	+	+	+	1 oylik va undan katta yoshdagi bolalar. Davolashning 1-kunida quyidagi sxema bo'yicha 8 tabletkadan oling: Birinchi 2 soatda har 30 daqiqada 1 tabletkadan (2 soat ichida jami 5 tabletka), so'ngra o'sha kun davomida yana 1 tabletkadan 3-marta teng vaqt oralig'ida oling. 2-kuni va undan keyin to'liq tiklanishigacha kuniga 3-marta 1 tabletkadan oling.	2 up
Virus qarshi preparat J05AB11	Valatsiklovir	Bolalarga ½ tabletkadan kuniga 2 mahal. - Varicella Zoster virusi keltirib chiqaradigan Zoster uchug'i va suvchechak - Herpes Simplex virusi keltirib chiqaradigan teri va shilliq pardalarning infeksiyalari (1 va 2 turdagi)	+	+	+	+	+	Bolalarga ½ tabletkadan kuniga 2 mahal. - Varicella Zoster virusi keltirib chiqaradigan Zoster uchug'i va suvchechak; - Herpes Simplex virusi keltirib chiqaradigan teri va shilliq pardalarning infeksiyalari (1 va 2 turdagi) - sitomyegalovirus (SMV) infeksiyasining ko'payishini kamaytirish uchun.	1up

		- sitomyegalovirus (SMV) infeksiyasining ko'payishini kamaytirish uchun.							
Virus qarshi preparat L03	aminodigidroftalazindion natriya	Rektal: 1 yosh va undan katta bolalar uchun, 1 ta shamchadan har kuni 5 kun, keyin 1 ta shamchadan har kuni 10 kun davomida. Kurs - 15 ta shamcha. Til ostiga tabletkalar. 1 tabletkadan sutkasiga 4 mahal gacha yoki 2 ta tabletkadan sutkasiga 2 mahal 5 kun.	+	+	+	+	+	Rektal: 1 yosh va undan katta bolalar uchun, 1 ta shamchadan har kuni 5 kun, keyin 1 ta shamchadan har kuni 10 kun davomida. Kurs - 15 ta shamcha. Til ostiga tabletkalar. 1 tabletkadan sutkasiga 4 mahal gacha yoki 2 ta tabletkadan sutkasiga 2 mahal 5 kun.	2up
Virus qarshi preparat	Azoksimera bromid	Parenteral yuborish uchun yeritmalar tayyorlash (mushak ichiga va tomir ichiga) Mushak ichiga yuborish uchun 3 mg preparat 1 ml (2 ml ga 6 mg doza) inyeksiya uchun suvda yoki 0,9% natriy xlorid eritmasida eritiladi. Solventni qo'shgandan so'ng, preparat shishishi uchun 2-3 daqiqaga qoldiriladi, keyin silkitmasdan aylanish harakatlari bilan aralashtiriladi. Vena	+	+	+	+	+	Parenteral yuborish uchun yeritmalar tayyorlash (mushak ichiga va tomir ichiga): Mushak ichiga yuborish uchun 3 mg preparat 1 ml (2 ml ga 6 mg doza) inyeksiya uchun suvda yoki 0,9% natriy xlorid eritmasida eritiladi. Solventni qo'shgandan so'ng, preparat shishishi uchun 2-3 daqiqaga qoldiriladi, keyin silkitmasdan aylanish harakatlari bilan aralashtiriladi. Vena ichiga tomchilab yuborish uchun preparat 2 ml steril 0,9%	2up

		<p>ichiga tomchilab yuborish uchun preparat 2 ml steril 0,9% natriy xlorid eritmasida eritiladi. Solventni qo‘shgandan so‘ng, preparat shishishi uchun 2-3 daqiqaga qoldiriladi, keyin aylanish harakatlari bilan aralashtiriladi. Bemor uchun hisoblangan doza steril tarzda 0,9% natriy xlorid eritmasi bo‘lgan shisha / sumkaga o‘tkaziladi. Intranazal va sublingual foydalanish uchun eritma tayyorlash: bolalar uchun 3 mg dozasi 1,0 ml (20 tomchi), 6 mg dozasi 2,0 ml (40 tomchi) (bir tomchi (0,05 ml)) eritiladi. tayyorlangan eritmada 0,15 mg preparat mavjud).</p>						<p>natriy xlorid eritmasida eritiladi. Solventni qo‘shgandan so‘ng, preparat shishishi uchun 2-3 daqiqaga qoldiriladi, keyin aylanish harakatlari bilan aralashtiriladi. Bemor uchun hisoblangan doza steril tarzda 0,9% natriy xlorid eritmasi bo‘lgan shisha / sumkaga o‘tkaziladi. Intranazal va sublingual foydalanish uchun eritma tayyorlash: bolalar uchun 3 mg dozasi 1,0 ml (20 tomchi), 6 mg dozasi 2,0 ml (40 tomchi) (bir tomchi (0,05 ml)) eritiladi. tayyorlangan eritmada 0,15 mg preparat mavjud).</p>	
Zamburug‘ga karshi vosita	Flukanozol	3mg/kg/sut 1 max 3-5 kun v/i	-	-	+	+	+	3mg/kg/sut 1 max 3-5 kun	3-5 fl
	Vorikanozol	3mg/kg/sut 1 max 3-5 kun v/i	-	-	+	+	+	3mg/kg/sut 1 max 3-5 kun	3-5 fl

Odam IgG	Pentaglobin (og'ir xollarda)	Kam vazndagi tug'ilganda bolalar nizkoy massoy tela pri rojenii - 0.5-1 g/kg interval bilan 1-2 xaf.	-	-	+	+	+	Kam vazndagi tug'ilganda bolalar nizkoy massoy tela pri rojenii - 0.5-1 g/kg interval bilan 1-2 xaf.	5fl
	Bioven Mono (og'ir xollarda)	10% 50ml 0,4-0,8 mg/kg/sut 1 max 3-5 kun 5% 50ml 0,4-0,8 mg/kg/sut 1 max 3-5 kun	-	-	+	+	+	10% 50ml 0,4-0,8 mg/kg/sut 1 max 3-5 kun 5% 50ml 0,4-0,8 mg/kg/sut 1 max 3-5 kun	
	Oktogam (og'ir xollarda)	5-10 %, 50-100 ml 0,4-0,8 mg/kg/sut 1 max 3-5 kun	-	-	+	+	+	5-10 %, 50-100 ml 0,4-0,8 mg/kg/sut 1 max 3-5 kun	
Fibrozga karshi preparat	Longidaza	3 yoshdan. Ampula 1500ME, 3000ME 1 ampula + 3ml fiz r-r elektroforez 7 minut davomida 6-10 kun, xar 3 oyda.	-	-	+	+	+	Ampula 1500ME, 3000ME 1 ampula + 3ml fiz r-r elektroforez 7 minut davomida 6-10 kun	8up
Kombinirlangan preparat	Berodual (berotek/atrovent)	1 ml = 20 kapel	-	-	+	+	+	1 ml = 20 kapel	1up
Sekretolitik	0,9% rastvor NaCl	2 ml 2 marta kunda	+	+	+	+	+	2 ml 2 marta kunda	Doimiy
	3% gipertonik eritma va gialuronat natriy - 1,0 mg (Lorde® Gial)	2 ml 2 marta kunda	+	+	+	+	+	2 ml 2 marta kunda	Doimiy
	Gianeб 7% (gialuronat natriya)	2 marta kunda	+	+	+	+	+	2 marta kunda	Doimiy

	1mg+natriy xlorid 70 mg)								
Mukolitik preparatlar	Dornaza – alfa	ingalyatsiya uchun mukolitik eritma 2,5mg/2,5 ml, standart doza, 2,5 mg (1 amp.) dan kuniga 1-marta, har kuni, ko`rsatma bo`lganda 2 marta, umri davomida, suyultirmasdan qo`llaniladi	+	+	+	+	+	ingalyatsiya uchun mukolitik eritma 2,5mg/2,5 ml, standart doza, 2,5 mg (1 amp.) dan kuniga 1-marta, har kuni, umri davomida, suyultirmasdan qo`llaniladi	Doimiy
	Asetilsistein (ASS)	Og`iz orqali kuniga 2-marta 100 mg yoki kuniga 2-marta 10 ml sirop (kuniga 400-600 mg atsetilsistein). 6 yoshdan 14 yoshgacha bo`lgan bolalar: 1 eruvchan tabletka. 100 mg dan kuniga 3-marta yoki 2 eruvchan tabletka kuniga 2-marta, 2 yoshdan bolalar.	+	+	+	+	+	Og`iz orqali kuniga 2-marta 100 mg yoki kuniga 2-marta 10 ml sirop (kuniga 400-600 mg atsetilsistein). 6 yoshdan 14 yoshgacha bo`lgan bolalar: 1 eruvchan tabletka. 100 mg dan kuniga 3-marta yoki 2 eruvchan tabletka kuniga 2-marta, 2 yoshdan bolalar.	² up
	Ambroksol	Og`iz orqali, 5 yoshdan 12 yoshgacha bo`lgan bolalar: 2 bo`lingan dozada kuniga 30-45 mg. 2 yoshdan 5 yoshgacha bo`lgan bolalar: 3 bo`lingan dozada kuniga 22,5 mg. 2 yoshgacha	+	+	+	+	+	Og`iz orqali, 5 yoshdan 12 yoshgacha bo`lgan bolalar: 2 bo`lingan dozada kuniga 30-45 mg. 2 yoshdan 5 yoshgacha bo`lgan bolalar: 3 bo`lingan dozada kuniga 22,5 mg. 2 yoshgacha bo`lgan bolalar: kuniga 15 mg 2 dozaga bo`lingan.	¹ up

	bo'lgan bolalar: kuniga 15 mg 2 dozaga bo'lingan.							
Asetilsistein	Ingalyatsiya 2–3 ml 2 marta kunda	+	+	+	+	+	Ingalyatsiya 2–3 ml 2 marta kunda	2up
Ambroksol	1–2 ml 2 marta kunda v/i	-	-	+	+	+	1–2 ml 2 marta kunda	14amp
Standartlangan quruq pechak/ ekstrakti (5-7,5:1) YEA 575 (Prospan)	Og'iz orqali sirop 7 mg/ ml: 1 yoshdan - kuniga 2-marta 2,5 ml, 1 yoshdan 6 yoshgacha - kuniga 3-marta 2,5 ml, 6 yoshdan 10 yoshgacha - kuniga 3- marta 5 ml. 20 mg/ml tomchi: 1 yoshdan 4 yoshgacha - kuniga 3- marta 12 tomchi, 4 yoshdan 10 yoshgacha - kuniga 3-marta 16 tomchi, 10 va undan katta yoshdagilar - kuniga 3-marta 24 tomchi. 65 mg tabletkalar: 6 yoshdan 12 yoshgacha - ½ tabletkalar. Kuniga 2- marta, 12 yoshdan oshgan bolalar - 1 tabletkalar. ertalab va ½ tab. Kechqurun. 35 mg paketlardagi eritma: 12 yoshdan oshgan	+	+	+	+	+	Og'iz orqali sirop 7 mg / ml: 0 yoshdan 1 yoshgacha - kuniga 2-marta 2,5 ml, 1 yoshdan 6 yoshgacha - kuniga 3-marta 2,5 ml, 6 yoshdan 10 yoshgacha - kuniga 3-marta 5 ml. 20 mg/ml tomchi: 1 yoshdan 4 yoshgacha - kuniga 3-marta 12 tomchi, 4 yoshdan 10 yoshgacha - kuniga 3-marta 16 tomchi, 10 va undan katta yoshdagilar - kuniga 3-marta 24 tomchi. 65 mg tabletkalar: 6 yoshdan 12 yoshgacha - ½ tabletkalar. Kuniga 2-marta, 12 yoshdan oshgan bolalar - 1 tabletkalar. ertalab va ½ tab. Kechqurun. 35 mg paketlardagi eritma: 12 yoshdan oshgan bolalar, 1 paket. Kuniga 3-marta, 6 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalar 1 paketdan kuniga 2-marta.	2fl

	bolalar, 1 paket. Kuniga 3-marta, 6 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalar 1 paketdan kuniga 2-marta.							
Butamirat+ Gvayfenezin	Ichkarida, 7 kg gacha, kuniga 3-4-marta 8 tomchi, - 7-12 kg, kuniga 3-4-marta 9 tomchi, - 12-20 kg, kuniga 3-marta 14 tomchi, - 20-30 kg, kuniga 3-4-marta 14 tomchi, - 30-40 kg, kuniga 3-4-marta 16 tomchi, - 40-50 kg, kuniga 3-marta 25 tomchi, - 50-70 kg, kuniga 3-marta 30 tomchi, - 70 kg dan ortiq, kuniga 3-marta 40 tomchi	+	+	-	-	-	Ichkarida, 7 kg gacha, kuniga 3-4-marta 8 tomchi, - 7-12 kg, kuniga 3-4-marta 9 tomchi, - 12-20 kg, kuniga 3-marta 14 tomchi, - 20-30 kg, kuniga 3-4-marta 14 tomchi, - 30-40 kg, kuniga 3-4-marta 16 tomchi, - 40-50 kg, kuniga 3-marta 25 tomchi, - 50-70 kg, kuniga 3-marta 30 tomchi, - 70 kg dan ortiq, kuniga 3-marta 40 tomchi	2fl
Gvayfenezin+ salbutamol+br omgeksin	3 yoshdan ichishga x 3 maxal (5ml); 6 yoshdan ichishga ½-1 tab.x3maxal	+	+	+	+	+	3 yoshdan ichishga x 3 maxal (5ml); 6 yoshdan ichishga ½-1 tab.x3maxal	1up
bradikininga, gistaminga, morfinga antitelal, tozalangan	3 yoshdan katta bolalar kuniga 3-marta 1-2 choy qoshiqdan foydalanadilar. Ovqatdan tashqari kuniga 3-marta 1-2 tabletkadan oling.	+	+	+	+	+	3 yoshdan katta bolalar kuniga 3-marta 1-2 choy qoshiqdan foydalanadilar. Ovqatdan tashqari kuniga 3-marta 1-2 tabletkadan oling. (to'liq eriguncha og'izda saqlang).	2up, 2fl

		(to'liq eriguncha og'izda saqlang).							
	Timyan o'ti (Thymiherba), pechak barglari (Hederaefolium)	Og'iz orqali sirop 7 mg / ml: 0 yoshdan 1 yoshgacha - kuniga 2-marta 2,5 ml, 1 yoshdan 6 yoshgacha - kuniga 3-marta 2,5 ml, 6 yoshdan 10 yoshgacha - kuniga 3-marta 5 ml. 20 mg/ml tomchi: 1 yoshdan 4 yoshgacha - kuniga 3-marta 12 tomchi, 4 yoshdan 10 yoshgacha - kuniga 3-marta 16 tomchi, 10 va undan katta yoshdagilar - kuniga 3-marta 24 tomchi. 65 mg tabletkalar: 6 yoshdan 12 yoshgacha - ½ tabletka. Kuniga 2-marta, 12 yoshdan oshgan bolalar - 1 tabletka. ertalab va ½ tab. Kechqurun. 35 mg paketlardagi eritma: 12 yoshdan oshgan bolalar, 1 sashe-paket. Kuniga 3-marta, 6 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalar 1 sashe-	+	+	-	-	-	Og'iz orqali sirop 7 mg / ml: 0 yoshdan 1 yoshgacha - kuniga 2-marta 2,5 ml, 1 yoshdan 6 yoshgacha - kuniga 3-marta 2,5 ml, 6 yoshdan 10 yoshgacha - kuniga 3-marta 5 ml. 20 mg/ml tomchi: 1 yoshdan 4 yoshgacha - kuniga 3-marta 12 tomchi, 4 yoshdan 10 yoshgacha - kuniga 3-marta 16 tomchi, 10 va undan katta yoshdagilar - kuniga 3-marta 24 tomchi. 65 mg tabletkalar: 6 yoshdan 12 yoshgacha - ½ tabletka. Kuniga 2-marta, 12 yoshdan oshgan bolalar - 1 tabletka. ertalab va ½ tab. Kechqurun. 35 mg paketlardagi eritma: 12 yoshdan oshgan bolalar, 1 sashe-paket. Kuniga 3-marta, 6 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalar 1 sashe-paketdan kuniga 2-marta	2up

		paketdan kuniga 2- marta							
	ronxitol- Farmaksis (Mannitol)	Kapsula 40 mg №280 Ingalyatsiya uchun	+	+	+	+	+	Kapsula 40 mg №280 Ingalyatsiya uchun	Doimiy
Ferment preparati	Kreon	10.000-25.000 ME 3000-10.000 ME /kg ovkat maxalda	+	+	+	+	+	10.000-25.000 YED 3000-10.000 YED /kg ovkat maxalda	Doimiy
Vitaminlar	Tokoferol atsetat	100 mg	+	+	+	+	+	100 mg	Doimiy
	Kolekalsiferol	suvli eritma 15000 ME/ml ichishga 1 max	+	+	+	+	+	suvli eritma 15000 ME/ml ichishga 1 max	Doimiy
	Retinol atsetat	5000 ME, 33000 ME.	+	+	+	+	+	5000 ME, 33000 ME.	Doimiy
	AkvaDeks yoki Dekas	4 dan 10 yoshgacha – kuniga 2 tabletka, jelatin kapsulalari 4 dan 10 yoshgacha – kuniga 1 ta jyelatin kapsulasi va ichishga suspenziya 0 dan 12 oygacha – kuniga 1 ml dan, 1 dan 3 yoshgacha – kuniga 2 ml.	+	+	+	+	+	4 dan 10 yoshgacha – kuniga 2 tabletka, jelatin kapsulalari 4 dan 10 yoshgacha – kuniga 1 ta jyelatin kapsulasi va ichishga suspenziya 0 dan 12 oygacha – kuniga 1 ml dan, 1 dan 3 yoshgacha – kuniga 2 ml.	Doimiy
	A	Barcha OOBЕ bilan	+	+	+	+	+	4000-10000 ME/sut	Doimiy
	D	Barcha OOBЕ bilan	+	+	+	+	+	400 - 2000 ME/sut	Doimiy
	E	barcha: 0-6 oy 6-12 oy 1-4 yosh 4-10 yosh 10 yoshdan katta	+	+	+	+	+	25 ME/sut ** 50 ME/sut 100 ME/sut 100-200 ME/sut 200 – 400 ME/sut	Doimiy

	K	Barcha OOBЕ bilan bemorlarda jigar patologiyasi bo'lganda	+	+	+	+	+	2– 5 mg/sut 2-10 mg/sut	Doimiy
	Beta-karotin	Barcha OOBЕ bilan	+	+	+	+	+	0,5 – 1 mg/kg/sut, maks. 50 mg/sut	Doimiy
NPVS	Ibuprofen	20-30 mg/kg dozada kuniga 2-marta – 6 yoshdan katta bolalar va kattalarga; maksimal sutkalik dozasi kattalar uchun 1,2 g; bolalar va o'smirlar uchun 12 dan 17 yoshgacha – 1,0 g ni tashkil qiladi	+	+	+	+	+	20-30 mg/kg dozada kuniga 2-marta – 6 yoshdan katta bolalar va kattalarga; maksimal sutkalik dozasi kattalar uchun 1,2 g; bolalar va o'smirlar uchun 12 dan 17 yoshgacha – 1,0 g ni tashkil qiladi	1up
Dezintoksikatsion davo	ORSA	Ichish uchun 500ml sutkada	+	+	+	+	+	Ichish uchun 500ml sutkada	
N ⁺ -K ⁺ -ATF – aza ingibitori	Omeprazol	0.7-3.3 mg/kg/sut Yoki 20mg/sut 1 max	+	+	+	+	+	0.7-3.3 mg/kg/sut Yoki 20mg/sut 1 max	

Izoh: *MV kechuviga qarab asosiy dorilar ro'yxati Milliy klinik protokollarda keltirilgan dori vositalarga o'zgartirish kiritiladi -kasallikning asoratlanishi kuzatilsa, asorat turiga qarab dori vositalari korreksiya qilinadi.

Davolash tadbirlari (qo'shimcha medikamentoz davo)		Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka	
		Ambulator yordam		Statsionar yordam					
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalar	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari			
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi								
Vitamin D ₃ Xolekalsiferol	1. Ichishga , 0 – 1 yosh – 1500ME, 1 – 5 yosh -2500ME, ot		+	+	+	+	+	0 – 1 yosh – 1500ME, 1 – 5 yosh -2500ME, ot 6 – 18	1 fl

(Akvadetrim)	6 – 18 yosh 3000ME						yosh 3000ME	
Sink preparati Immunotsink	2. Ichishga , 1 yoshgacha – 10 mg; 1-6 yosh – 22 mg; 6-10 yosh – 25 mg; 10-16 yosh – 28 mg; 16-18 let – 32 mg.	+	+	+	+	+	1 yoshgacha – 10 mg; 1-6 yosh – 22 mg; 6-10 yosh – 25 mg; 10-16 yosh – 28 mg; 16-18 let – 32 mg.	2up
Enterosorbent terapiya Dioksid kremniy yuqoridisperli+ Laktuloza	3 yoshdan 7 yoshgacha bo‘lgan bolalar: kuniga 1-marta 1 sashe-paket; 7 yoshdan 12 yoshgacha bo‘lgan bolalar: kuniga 2-marta 1 sashe-paket; 12 yoshdan oshgan bolalar va kattalar: kuniga 3-marta 1 sashe-paket. Mahsulotning tayyorlangan suvli suspenziyasi ovqatdan yoki dori-darmonlardan 1 soat oldin og‘iz orqali olinadi.	+	+	+	+	+	3 yoshdan 7 yoshgacha bo‘lgan bolalar: kuniga 1-marta 1 sashe-paket; 7 yoshdan 12 yoshgacha bo‘lgan bolalar: kuniga 2-marta 1 sashe-paket; 12 yoshdan oshgan bolalar va kattalar: kuniga 3-marta 1 sashe-paket. Mahsulotning tayyorlangan suvli suspenziyasi ovqatdan yoki dori-darmonlardan 1 soat oldin og‘iz orqali olinadi.	2up
Probulard Bioterol	4 yoshdan 6 yoshgacha - kuniga 1-marta 1 kapsuladan; - 6 yoshdan va kattalar - kuniga 2-marta 1 kapsuladan. Qo‘llash bo‘yicha ko‘rsatmalar: 6 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun kapsulaning tarkibini bir stakan suyuqlikka (xona haroratiga qadar sovutilgan qaynatilgan suv, bolalar ovqati) bir martalik dozada quyding.	+	+	+	+	+	4 yoshdan 6 yoshgacha - kuniga 1-marta 1 kapsuladan; - 6 yoshdan va kattalar - kuniga 2-marta 1 kapsuladan. Qo‘llash bo‘yicha ko‘rsatmalar: 6 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun kapsulaning tarkibini bir stakan suyuqlikka (xona haroratiga qadar sovutilgan qaynatilgan suv, bolalar ovqati) bir martalik dozada quyding.	2up
Galavit	Fl. 50mg/sut m/o,	+	+	+	+	+	Fl. 50mg/sut m/o,	10-15fl

	Rektal 50mg/sut, Ichishga 50mg tab 1 max 10-15 kun						Rektal 50mg/sut, Ichishga 50mg tab 1 max 10 15 kun	
Polioksidoniy	3-6mg/sut v/i, m/o 1 max 10 kun	-	-	+	+	+	3-6mg/sut v/i, m/o 1 max 10 kun	10 fl
Askoril	Tab. 12 yoshdan 1 tab 3 max 10 kun, 6-12 yosh ½ tab 3 max 10 kun Sirop 6-12 yosh 5-10 ml 3 max 10 kun	+	+	+	+	+		

Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq) MV kechuviga qarab qo'shimcha dorilar ro'yxati Milliy klinik protokollarda keltirilgan dori vositalarga o'zgartirish kiritiladi;
- kasallik asoratlanishi kuzatilsa, asorat turiga qarab dori vositalari korreksiya qilinadi.

(REJALI JARROHLIK AMALIYOTI)

Davolash tadbirlari (operativ davo)	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha				
	Ambulator yordam		Statsionar yordam		
Jarrohlik amaliyoti/aralashuv/muolaja nomi	OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari
1. Bronxoalveolyar lavaj	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi
2. Bronxoskopiya	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi
3. Polipektomiya	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajarilmaydi	bajariladi	bajariladi
Izoh:* jarroxlik amaliyotini o'tkazish uchun sharoit mavjud bo'lgan xususiy statsionarda o'tkazilishi talab qilinadi;					

(DAVOLOVCHI OVQATLANISH/PARHEZ)

Ovqatlanish tartibi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha				
	Ambulator yordam		Statsionar yordam		
Parhez stoli va uning davomiyligi	OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari
1. Parhez (stol №1A keyinchalik 1B stoli) 2. O'rta zanjirli trigliseridlar bilan sut oqsili gidrolizatlariga asoslangan aralashmalar - Chala tug'ilgan va kam vaznli chaqaloqlarga mo'ljallangan oqsil miqdori yuqori bo'lgan suyuq maxsus sutli ozuqa maxsuloti - maxsus yuqori energiyali kokteyllar yoki o'rta zanjirli trigliseridlar bilan enteral ovqatlanish uchun aralashmalar (1 yoshdan oshgan bolalar uchun)	OSH	1. OSH 2. Pediatr	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Gastroenterolog 4. Kardiolog 5. Lor	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Gastroenterolog 4. Kardiolog 5. Lor	1. Pediatr 2. Pulmonolog 3. Gastroenterolog 4. Kardiolog 5. Lor

fizioterapiya	1. OSH 2. Pediatr 3. Fizioterapiya shifokori	1. OSH 2. Pediatr 3. Fizioterapiya shifokori	1. Pediatr 2. Gastroenterolog 3. Fizioterapiya shifokori	1. Pediatr 2. Gastroenterolog 3. Fizioterapiya shifokori	1. Pediatr 2. Gastroenterolog 3. Fizioterapiya shifokori
---------------	--	--	--	--	--

MUKOVISSIDOZ NOZOLOGIYA BO'YICHA TEZ VA SHOSHILINCH TIBBIY YORDAM KO'RSATISH HOLATLARDA

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Tez va shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam*				
		TTYO/ uy sharoitida	OP/ OSHP / KTMP	Tumanlararo shoshilinch yordam markazi	Viloyat shoshilinch tez tibbiy yordam IATM filiali	Respublika shoshilinch va tez tibbiy yordam IAT markazi		
Asosiy mutaxassis (shifokor) maslahati	1.							
	2.							
	...							
Izoh:								
Mutaxassis (shifokor) maslahati (qo'shimcha)	1.							
	2.							
	...							
Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)								
Asosiy laborator tekshiruvlar	1.							
	2.							
	...							
Izoh:								
Qo'shimcha laborator tekshiruvlar	1.							
	2.							
	...							
Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)								
Asosiy instrumental tekshiruvlar	1.							
	2.							
	...							
Izoh:								
Qo'shimcha instrumental tekshiruvlar	1.							
	2.							
	...							
Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)								

***SHOSHILINCH STATSIONAR DAVOGA KO'RSATMA: (bu yerga ambulator davo jarayonida paydo bo'ladigan statsionar davoga ko'rsatmalar yoziladi)**

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Tez va shoshilinch yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam*				
		TTYO/ uy sharoitida	OP/ OSHP / KTMP	Tumanlararo shoshilinch yordam markazi	Viloyat shoshilinch tez tibbiy yordam IIATM filiali	Respublika shoshilinch va tez tibbiy yordam IIAT markazi		
Boshqa turdagi tekshiruvlar	1.							
	2.							
	...							
Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)								

(MEDIKAMENTOZ DAVO)

Davolash tadbirlari (asosiy medikamentoz davo)		Tez va shoshilinch yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator yordam		Statsionar yordam*				
		TTYO/ uy sharoitida	OP/ OSHP / KTMP	Tumanlararo shoshilinch yordam markazi	Viloyat shoshilinch tez tibbiy yordam IIATM filiali	Respublika shoshilinch va tez tibbiy yordam IIAT markazi		
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi							
1.								
2.								
...								

Izoh:

Davolash tadbirlari (qo'shimcha medikamentoz davo)		Tez va shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator yordam		Statsionar yordam*				
		TTYO/ uy sharoitida	OP/ OSHP / KTMP	Tumanlararo shoshilinch yordam markazi	Viloyat shoshilinch tez tibbiy yordam IIATM filiali	Respublika shoshilinch va tez tibbiy yordam IIAT markazi		
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi							
1.	1.							
2.	2.							
...	...							

Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)

(TEZ VA SHOSHILINCH JARROHLIK AMALIYOTI)

Davolash tadbirlari (operativ davo)	Tez va shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha				
	Ambulator yordam		Statsionar yordam*		
	TTYO/ uy sharoitida	OP/ OSHP/ KTMP	Tumanlararo shoshilinch yordam markazi	Viloyat shoshilinch tez tibbiy yordam IIATM filiali	Respublika shoshilinch va tez tibbiy yordam IIAT markazi
Jarrohlik amaliyoti/aralashuv/muolaja nomi					
1.					
2.					
...					
Izoh: (bu yerga jarrohlik amaliyoti/aralashuv/muolajani o'tkazish uchun ko'rsatma keltiriladi)					

(DAVOLOVCHI OVQATLANISH/PARHEZ)

Ovqatlanish tartibi	Tez va shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha				
	Ambulator yordam		Statsionar yordam*		
	TTYO/ uy sharoitida	OP/ OSHP / KTMP	Tumanlararo shoshilinch yordam markazi	Viloyat shoshilinch tez tibbiy yordam IIATM filiali	Respublika shoshilinch va tez tibbiy yordam IIAT markazi
Parhez stoli va uning davomiyligi					
Izoh: (Statsionardan chiqishga ko'rsatma/ rejali shifoxonaga o'tkazishga ko'rsatma to'liq yozilishi kerak)					

(DISPANSERIZATSIYA)

(SOG'LOM KONTINGENT DISPANSERIZATSIYASI/"D" NAZORATGA OLINGAN BEMOR DISPANSERIZATSIYASI)

Dispanserizatsiya tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	OSHP/OP	KTMP	Tadbirlar minimal soni	Dispanser nazorati muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati	1. Shifokorning klinik va fizikal tekshiruvlari	1. OSH 2. Pediatr	1. OSH 2. Pediatr	1. Barcha MV bo'lgan bolalar "D" nazoratiga o'tkaziladi. Birlamchi shifoxonada davolanib chiqqandan so'ng doimiy shifokor nazorati.	"D" nazoratda turgan bolalarda kasallik xuruji kuzatilganida yilda kamida 1-marta statsionar davo o'tkazish; kasallik asoratlanishi kuzatilganida RISHTYOIATM va RIPIATM va ularning viloyat filiallarida jarrohlik amaliyotini o'tkazish
	2.				
	...				
Izoh:					
Laborator tekshiruvlar	1.				
	2.				
	...				
Izoh:					
Instrumental tekshiruvlar	1.				
	2.				
	...				
Izoh:					

(BIRLAMCHI, IKKILAMCHI VA UCHLAMCHI PROFILAKTIKA/ SKRINING)

Profilaktika tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	OSHP/OP	KTMP	Tadbirlar minimal soni	Reabilitatsiya muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati	1.				
	2.				
	...				
Izoh:					
Laborator tekshiruvlar	1.				
	2.				
	...				
Izoh:					
Instrumental tekshiruvlar	1.				
	2.				
	...				
Izoh:					
Profilaktika usullar	1.				
	2.				
	...				
Izoh:					
Davolash tadbirlari (nomedikamentoz davo)		OSHP/OP	KTMP	O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
Profilaktik fito/dori vositalarining (xalqaro patentlanmagan) nomi	Profilaktik fito/dori vositalari dozirovkasi va qo'llanilishi				
1.					
2.					
...					
Izoh:					

(REABILITATSIYA)

Reabilitatsiya tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	Uy sharoitida	OSHP/OP / KTMP	Statsionar sharoitida	Tadbirlar minimal soni	Reabilitatsiya muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati	1.					
	2.					
	...					
Izoh:						
Laborator tekshiruvlar	1.					
	2.					
	...					
Izoh:						
Instrumental tekshiruvlar	1.					
	2.					
	...					
Izoh:						
*Bu yerga nozologiya bo'yicha bemorlarni uy/poliklinikv/statsionar sharoitida o'tkazilishi kerak bo'lgan reabilitatsiyaga ko'rsatmalar kiritilishi kerak						
Reabilitatsion usullar	1.					
	2.					
	...					
Izoh:						
Davolash tadbirlari (medikamentoz davo)		Uy sharoitida	OSHP/OP / KTMP	Statsionar sharoitida	O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi					
1.						
2.						
...						
Izoh:						

(PALLIATIV DAVO)

Palliativ tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	Uy sharoitida	OSHP/OP / KTMP	Statsionar sharoitida	Tadbirlar minimal soni	Reabilitatsiya muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati	1.					
	2.					
	...					
Izoh:						
Laborator tekshiruvlar	1.					
	2.					
	...					
Izoh:						
Instrumental tekshiruvlar	1.					
	2.					
	...					
Izoh:						
*Bu yerga nozologiya bo'yicha bemorlarni uy/poliklinikv/statsionar sharoitida o'tkazilishi kerak bo'lgan palliativ davoga ko'rsatmalar kiritilishi kerak						
Palliativ davo usullar	1.					
	2.					
	...					
Izoh:						
Davolash tadbirlari (medikamentoz/nomedikamentoz davo)		Uy sharoitida	OSHP/OP / KTMP	Statsionar sharoitida	O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
Dori-vositasi/fito-preparatning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositasi/fito- preparatning dozirovkasi va qo'llanilishi					
1.						
2.						
...						
Izoh:						