


Приложение
к приказу № 180
от «23» июня 2025 года
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УРОЛОГИИ**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ
ОСТРЫЙ ОРХОЭПИДИДИМИТ**

ТОШКЕНТ-2025

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Республиканского специализированного
научно-практического центра урологии



Ш.Т. Мухтаров

« _____ » 2025г

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ
ОСТРЫЙ ОРХОЭПИДИДИМИТ

ТОШКЕНТ-2025

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ

ОСТРЫЙ ОРХОЭПИДИДИМИТ

НАЗВАНИЕ (КОД) НОЗОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КЛИНИЧЕСКОГО СТАНДАРТА, СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ

Кодирование по МКБ-10/11:	Нозологическое наименование:	Специалисты, привлекаемые для диагностики и лечения нозологии в амбулаторных условиях:		Специалисты, привлекаемые для диагностики и лечения нозологии в стационарных условиях:	
		Основной контролирующей специалист:	Дополнительно привлекаемые специалисты:	Основной контролирующей специалист:	Дополнительно привлекаемые специалисты:
По МКБ-10:		Уролог, Семейный врач	Фтизиоуролог, уролог-андролог	Уролог	Фтизиоуролог, уролог-андролог
N10	Острый орхоэпидидимит				
По МКБ-11:					
G802	Острый орхоэпидидимит				

ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДИАГНОСТИКЕ, ЛЕЧЕНИЮ, РЕАБИЛИТАЦИИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОСТРОГО ОРХОЭПИДИДИМИТА

Диагностические мероприятия:	Наименование медицинских услуг:	По уровню и виду плановой медицинской помощи:					Минимальное количество предоставляемых услуг или проводимых обследований	Срок лечения
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь				
		СВП	СП/МСП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
Консультация основного специалиста (врача)	1. Жалобы и анамнез						2	Срок лечения: в зависимости от обращения Продолжительность лечения: до 1 месяца
	2. Объективный осмотр	СВ	СВ/Уролог	Уролог	Уролог	Уролог		
	3. Физикальное и клиническое обследование							
Примечание: В случаях отсутствия специалиста в районе пациенты направляются в соседний район.								
Консультация специалиста (врача) (дополнительно)	1. Жалобы и анамнез						1	Срок лечения: в зависимости от обращения Продолжительность лечения: до 1 месяца
	2. Объективный осмотр	-	Фтизиоуролог, уролог-андролог	Фтизиоуролог, уролог-андролог	Фтизиоуролог, уролог-андролог	Фтизиоуролог, уролог-андролог		
	3. Физикальное и клиническое обследование							
Примечание: При выявлении сопутствующих заболеваний во время осмотра пациента, консультации дополнительных специалистов проводятся в соответствии с уровнем медицинского учреждения и показаниями.								
Основные лабораторные исследования	1. Общий анализ крови	+	+	+	+	+	1	
	1. Общий анализ мочи	+	+	+	+	+	2	
	2. Биохимический анализ крови	+	+	+	+	+	1	
	3. Коагулограмма	-	-	-	+	+	1	
	4. Реакция Вассермана (RW)	-	-	+	+	+	1	
	5. Определение HBsAg	-	-	+	+	+	1	
	6. Определение ВИЧ	-	-	+	+	+	1	
	7. Определение Anti-HCV	-	-	+	+	+	1	
	8. Определение группы крови	-	-	+	+	+	1	
	9. Бактериологический посев мочи	-	-	+	+	+	2	

Примечание: При выявлении сопутствующих заболеваний во время осмотра пациента, дополнительные исследования проводятся в соответствии с уровнем медицинского учреждения и показаниями.							
Дополнительные лабораторные исследования	1. Прокальцитонин	-	-	-	+	+	1
	2. Определение уровня глюкозы в крови	+	+	+	+	+	1
Примечание: При выявлении сопутствующих заболеваний во время осмотра пациента дополнительные исследования проводятся в соответствии с уровнем медицинского учреждения и показаниями							
Основные инструментальные исследования	1. УЗИ почек	-	+	+	+	+	1
	2. УЗИ мочевого пузыря	-	+	+	+	+	1
	3. УЗИ мошонки	-	+	+	+	+	2
Примечание: При выявлении сопутствующих заболеваний во время осмотра пациента дополнительные исследования проводятся в соответствии с уровнем медицинского учреждения и показаниями							
Дополнительные инструментальные исследования	1. Общая рентгенография (рентгеноскопия)	-	+	+	+	+	1
	2. Экскреторная урография	-	+	+	+	+	1
	3. КТ почек	-	+	+	+	+	1
	4. Уретроцистоскопия	-	-	+	+	+	1
	5. Контрастная КТ	-	-	+	+	+	1
	6. Электрокардиография (ЭКГ)	-	-	+	+	+	1
Примечание: При выявлении сопутствующих заболеваний во время осмотра пациента, дополнительные исследования проводятся в соответствии с уровнем медицинского учреждения и показаниями							

СВП – семейный врачебный пункт, СП – семейная поликлиника, МСП – многопрофильная семейная поликлиника, СВ – семейный врач, СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита, УЗИ – ультразвуковое исследование, МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография, Эхо-КГ – эхокардиография

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ:

Если в яичках наблюдается гнойно-деструктивное осложнение.

(МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Лечебные мероприятия (основное медикаментозное лечение)		По уровню и виду плановой медицинской помощи					Средняя суточная дозировка	Курсовая дозировка
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь				
Название лекарственного средства (международное непатентованное наименование)	Дозировка и применение	СВ П	СП/МС П	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
Цефтриаксон	1,0 г, два раза в сутки, раствор для инъекций, от 7 дней	+	+	+	+	+	2 г/сут.	12-14 г
Цефотаксим	1,0 г, два раза в сутки, раствор для инъекций, от 7 дней	+	+	+	+	+	2 г/сут.	12-14 г
Цефуроксим	1,0 г, два раза в сутки, раствор для инъекций, от 7 дней	+	+	+	+	+	2 г/сут.	12-14 г
Цефоперазон	1,0 г, два раза в сутки, раствор для инъекций, от 7 дней	+	+	+	+	+	2 г/сут.	12-14 г
Цефоперазон + сульбактам	2,0 г, два раза в сутки, раствор для инъекций, от 7 дней	+	+	+	+	+	4 г/сут.	22-24 г
Офлоксацин	400-800	+	+	+	+	+	400-800 мг/сут	Дозировка и

	мг/сут, два раза в сутки, 7-14 дней							способ введения индивидуально
Ципрофлоксацин	500-1000 мг/сут кунига 2 марта 7-14 кун	+	+	+	+	+	500-1000 мг/сут	Дозировка и способ введения индивидуально
Левифлоксацин	500 мг/сут кунига 1 марта 7-14 кун	+	+	+	+	+	500 мг/сут	Дозировка и способ введения индивидуально
Моксифлоксацин	400 мг/сут кунига 1 марта 7-14 кун	+	+	+	+	+	400 мг/сут	Дозировка и способ введения индивидуально
Сульфометаксазол / Триметапим 400+80 мг	0,4-2,0 г/сут, два раза в сутки, 7-14 дней	+	+	+	+	+	0,4-2,0 г/сут	0,4 мг/сут. Длительность лечения подбирается индивидуально
Парацетамол	Таблетки 200 мг; 500 мг Суспензия 120 мг/5 мл Сироп 2,4% 40 мл; 50 мл; 60 мл; 90 мл; 100 мл Суппозитории 50 мг; 100 мг; 125 мг; 250 мг Раствор для инфузий 10 мг/мл, 200 мг/20 мл; 1000 мг/100 мл	+	+	+	+	+	Дозировка и способ введения индивидуальн о	Дозировка и способ введения индивидуально
Диклофенак	Таблетки 25	+	+	+	+	+	Дозировка и	Дозировка и

	мг; 46,5 мг; 50 мг; 75 мг; 100 мг Капсулы 75 мг; 100 мг Раствор для инъекций 25 мг/мл; 75 мг/3 мл; 1 мл; 3 мл						способ введения индивидуально	способ введения индивидуально
Кетопрофен	Раствор для инъекций 50 мг/мл; 100 мг/2 мл Инъекционный раствор 50 мг Капсулы 100 мг; 150 мг; 200 мг Таблетки форте 100 мг; 150 мг Ректальные свечи 100 мг	+	+	+	+	+	Дозировка и способ введения индивидуально	Дозировка и способ введения индивидуально
Ибупрофен	Таблетки 200 мг; 400 мг; 800 мг Капсулы 200 мг; 300 мг; 400 мг Суспензия 100 мг/5 мл; 200 мг/5 мл; 60 мл; 100 мл; 120 мл; 150 мл; 200 мл Раствор для инфузий 400	+	+	+	+	+	Дозировка и способ введения индивидуально	Дозировка и способ введения индивидуально

	мг/4 мл (4 мл); 800 мг/8 мл (8 мл) Сироп 100 мг/5 мл Ректальные свечи 60 мг; 125 мг							
Декскетопрофен	Таблетки 25 мг Раствор для инъекций 25 мг/2 мл; 50 мг/2 мл	+	+	+	+	+	Дозировка и способ введения индивидуальн о	Дозировка и способ введения индивидуально
Мелоксикам	Таблетки 7,5 мг; 15 мг Раствор для инъекций 10 мг/1,5 мл; 15 мг/1,5 мл; 5 мг/мл 3 мл Ректальные свечи 7,5 мг; 15 мг	+	+	+	+	+	Дозировка и способ введения индивидуальн о	Дозировка и способ введения индивидуально
Кеторолак	Таблетки 7,5 мг; 10 мг Раствор для инъекций 30 мг/мл 1 мл; 2 мл	+	+	+	+	+	Дозировка и способ введения индивидуальн о	Дозировка и способ введения индивидуально
Выбор антибактериальных препаратов указан в национальном клиническом протоколе по нозологии «Орхиэпидидимит»								

Лечебные мероприятия (дополнительная медикаментозная терапия)		По уровню и виду плановой медицинской помощи					Средняя суточная дозировка	Курсовая дозировка
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь				
Название лекарственного средства (международное непатентованно е наименование)	Дозировка и применени е	СВ П	СП/МС П	Районные (городские) больницы	Медицински е учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканског о уровня		
Метоклопрамид	Таблетки 10 мг, раствор для инъекций 0,5% 2 мл	-	-	+	+	+	Дозировка и способ введения индивидуально	Дозировка и способ введения индивидуальн о

ПЛАНОВАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Лечебные мероприятия (оперативное лечение)	По уровню и виду плановой медицинской помощи				
	Амбулаторное лечение		Стационарное лечение		
Название операции/вмешательства/лечения	ПСВ	СП/МПЦП	Районные (городские) больницы*	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня
1 Дренирование абсцесса	-	-	+	+	+
2. Орхэктомия (удаление яичка):	-	-	+	+	+
3 Эпидидимэктомия (удаление придатка яичка):	-	-	-	+	+
Примечание. * - Хирургическое вмешательство выполняется при наличии достаточной материально-технической базы и квалифицированного специалиста.					

(ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ/ДИЕТА)

Из диеты следует исключить острые и соленые блюда, спиртные напитки.

ЭКСТРЕННАЯ (СКОРАЯ) МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОРХОЭПИДИДИМИТЕ

Лечебные мероприятия (оперативное лечение)	По уровню и виду плановой медицинской помощи				
	Амбулаторное лечение		Стационарное лечение		
	ПСВ	СП/МПЦП	Районные (городские) больницы*	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня
Название операции/вмешательства/лечения					
1 Дренирование абсцесса	-	-	+	+	+
2. Орхэктомия (удаление яичка):	-	-	+	+	+
3 Эпидидимэктомия (удаление придатка яичка):	-	-	-	+	+
Примечание. * - Хирургическое вмешательство выполняется при наличии достаточной материально-технической базы и квалифицированного специалиста.					

(ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ)

(Диспансеризация пациентов, взятых под "Д" наблюдение)

Мероприятия по диспансеризации	Наименование медицинских услуг	СВП/СП	МСП	Минимальное количество мероприятий	Срок профилактики
Консультация специалиста (врача)	Осмотр врача	+	+	1	1 мес.
Примечание: Пациенты наблюдаются до 1 месяца после клинического и лабораторного выздоровления от острого орхоэпидидимита.					
Лабораторные исследования	1. Анализ мочи	+	+	1	1 мес.
Примечание: У пациентов через 1 месяц после выздоровления проводится однократный анализ мочи.					

ПРОФИЛАКТИКА

Мероприятия по диспансеризации	Наименование медицинских услуг	СВП/СП	МСП	Минимальное количество мероприятий	Срок профилактики
Консультация специалиста (врача)	Осмотр врача	+	+	1	По показанию
Примечание: После лечения острого орхоэпидидимита в амбулаторных условиях проводятся первичные и вторичные профилактические мероприятия. Эти профилактические меры применяются только у пациентов, относящихся к группе риска.					
Лабораторные исследования	1. Анализ мочи	+	+	1	По показанию
Примечание: При проведении скрининга острого орхоэпидидимит может использоваться анализ мочи.					

