

Приложение
к приказу № 180
от «23» июня 2025 года
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

РЕСПУБЛИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УРОЛОГИИ

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ
ОСТРЫЙ НЕОСЛОЖНЁННЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ**

ТАШКЕНТ-2024

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор специализированного научно-
практического медицинского центра
урологии

Ш. Мухтаров



" _____ 2025г.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ
ОСТРЫЙ НЕОСЛОЖНЁННЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ**

ТАШКЕНТ-2025

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ ОСТРЫЙ НЕОСЛОЖНЁННЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ

**НАЗВАНИЕ (КОД) НАЦИОНАЛЬНОГО КЛИНИЧЕСКОГО СТАНДАРТА ПО НОЗОЛОГИИ, НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДИАГНОСТИКОЙ И ЛЕЧЕНИЕМ**

Код МКБ-10/11:	Название нозологии	Специалисты, занимающиеся нозологиями для диагностики и лечения в амбулаторных условиях		Специалисты, занимающиеся нозологиями для стационарной диагностики и лечения	
		Главный курирующий специалист	Дополнительные специалисты, которые будут привлечены	Главный курирующий специалист	Дополнительные специалисты, которые будут привлечены
МКБ-10		Уролог, семейный врач	Гинеколог, эндокринолог, инфекционист, нефролог	Уролог	Гинеколог, эндокринолог, инфекционист, нефролог
N10	Острый тубулоинтерстициальный нефрит				
МКБ-11					
GB51	Острый пиелонефрит				

ПЛАНОВАЯ ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ И ДИСПАНСЕРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ОСТРОМ НЕОСЛОЖНЁННОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ

Диагностические мероприятия	Название медицинских услуг	По уровню и виду плановой медицинской помощи					Минимальное количество услуг или обследований	Продолжительность лечения
		Амбулаторное лечение		Стационарное лечение*				
		ПСВ	СП/МПЦП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
Консультация главного специалиста (врача)	1. Жалобы и анамнез 2. Объективный осмотр 3. Физикальное и клиническое обследование.	Семейный врач	Семейный врач / уролог	Уролог	Уролог	Уролог	2	Период лечения: по обращению Продолжительность лечения: 1 месяц
Примечание: В случаях отсутствия специалиста в районе пациенты направляются в соседний район.								
Консультация (дополнительного) специалиста (врача)	1. Жалобы и анамнез 2. Объективный осмотр 3. Физикальное и клиническое обследование.	-	Гинеколог, эндокринолог, инфекционист, нефролог	Гинеколог, эндокринолог, инфекционист, нефролог	Гинеколог, эндокринолог, инфекционист, нефролог	Гинеколог, эндокринолог, инфекционист, нефролог	1	Период лечения: по обращению Продолжительность лечения: 1 месяц
Примечание. При выявлении сопутствующих заболеваний при обследовании пациента проводятся дополнительные консультации специалистов согласно показаниям на уровне медицинских учреждений.								
Основные лабораторные анализы	1. Общий анализ крови	+	+	+	+	+	2	
	2. Общий анализ мочи	+	+	+	+	+	2	
	3. Биохимический анализ крови	+	+	+	+	+	1	
	4. Коагулограмма	-	-	-	+	+	1	
	5. Реакция Вассермана (RW)	-	-	+	+	+	1	
	6. Определение HBsAg	-	-	+	+	+	1	
	7. Определение ВИЧ	-	-	+	+	+	1	
	8. Определение AntiHCV	-	-	+	+	+	1	

	9. Определение группы крови	-	-	+	+	+	1	
	10. Бактериологическое исследование мочи	-	-	+	+	+	1	

Примечание: При выявлении сопутствующих заболеваний при осмотре больного проводятся дополнительные обследования по показаниям, основанным на уровне медицинских учреждений.

Дополнительные лабораторные исследования	1. Прокалцитонин	-	-	-	+	+	1	
	2. Определение уровня глюкозы в крови	+	+	+	+	+	1	

Примечание: При выявлении сопутствующих заболеваний при осмотре больного проводятся дополнительные обследования по показаниям, основанным на уровне медицинских учреждений.

Основные инструментальные исследования	1. УЗИ почек	-	+	+	+	+	1	
	2. УЗИ мочевого пузыря	-	+	+	+	+	2	

Примечание: При выявлении сопутствующих заболеваний при осмотре больного проводятся дополнительные обследования по показаниям, основанным на уровне медицинских учреждений.

Дополнительные инструментальные исследования	1. Обзорная рентгенография	-	+	+	+	+	1	
	2. Экскреторная урография	-	-	+	+	+	1	
	3. МКСТ почек	-	-	+	+	+	1	
	4. МКСТ с контрастом	-	-	+	+	+	1	
	5. ЭКГ	+	+	+	+	+	1	

Примечание: При выявлении сопутствующих заболеваний при осмотре больного проводятся дополнительные обследования по показаниям, основанным на уровне медицинских учреждений.

ПСВ – пункт семейного врача; СП – семейная поликлиника; МПСП – многопрофильная семейная поликлиника; ВИЧ – вирус иммунодефицита человека; УЗИ – ультразвуковое исследование; МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография; ЭКГ - электрокардиография

ПОКАЗАНИЯ К СТАЦИОНАРНОМУ ЛЕЧЕНИЮ:

Острый неосложнённым пиелонефрит в большинстве случаев лечатся амбулаторно. Однако в следующих ситуациях необходимо госпитализация больного в стационар:

- Тяжёлое состояние, требующая интенсивной терапии и наблюдения;
- Невозможность обеспечения адекватного амбулаторного лечения;
- Необходимость проведения дополнительных инструментальных и лабораторных обследований;
- Развитие осложнений, т.е. переход неосложнённого пиелонефрита в осложнённую форму;
- Невозможность обеспечения безопасности пациента. В случае, когда безопасность пациента не может быть обеспечена в амбулаторных условиях из-за тяжести состояния или наличия социальных или психологических факторов, требующих наблюдения в стационаре.

(МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Лечебные мероприятия (основное медикаментозное лечение)		По уровню и виду плановой медицинской помощи					Средняя суточная дозировка	Дозировка на один курс
		Амбулаторное лечение		Стационарное лечение				
Международное непатентованное название препарата	Дозировка и применение препарата	ПСВ	СП/МПЦП	Районные (городские) больницы	Медицин- ские учреждения областного уровня	Медицин- ские учреждения республи- канского уровня		
Офлоксацин 400мг	400-800 мг/сут 2 раза в день 7-14 дней	+	+	+	+	+	400-800 мг/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально .
Ципрофлоксацин 500 мг	500 мг/сут 2 раза в день 7-14 дней	+	+	+	+	+	1000 мг/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально .
Левифлоксацин 500 мг	500 мг/сут 1 раз в день 7-14 дней	+	+	+	+	+	500 мг/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально .
Моксифлоксацин 400 мг	400 мг/сут 1 раз в день 7-14 дней	+	+	+	+	+	400 мг/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально .

Сульфометаксазол/Три метаприм 400+80 мг	0,4-2,0 г/сут 2 раза в день 7-14 дней	+	+	+	+	+	0,4-2,0 г/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально
Амикацин 0,5 г	7,5 мг/кг каждые 12 часов в течении 10 дней	+	+	+	+	+	15 мг/кг/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально
Пиперациллин + тазобактам 4,5 г	13,5 мг/сут 3 раза в день в течении 7 дней	+	+	+	+	+	13,5 мг/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально
Ампициллин + сульбактам 1,5 г	3 г/сут 2 раза в день 7 дней	+	+	+	+	+	3 г/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально
Амоксициллин / клавуланат 625 мг	1875 мг/сут 3 раза в день 7 дней	+	+	+	+	+	1875 мг/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально
Цефуроксим 1,0 г	2,0 г/сут 2 раза в день 7 дней	+	+	+	+	+	2,0 г/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально

Цефотаксим 1,0 г	2,0 г/сут 2 раза в день 7 дней	+	+	+	+	+	2,0 г/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально .
Цефоперазон 1,0 г	2,0 г/сут 2 раза в день 7 дней	+	+	+	+	+	2,0 г/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально .
Цефтриаксон 1,0 г	2,0 г/сут 2 раза в день 7 дней	+	+	+	+	+	2,0 г/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально .
Цефтазидим 1,0 г	2,0 г/сут 2 раза в день 7 дней	+	+	+	+	+	2,0 г/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально .
Цефоперазон + сульбактам 1,0 г + 0,5 г или 1,0 г	2,0 г/сут 2 раза в день 7 дней	+	+	+	+	+	2,0 г/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально .
Цефепим 1,0 г	2,0 г/сут 2 раза в день 7 дней	+	+	+	+	+	2,0 г/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально .

Цефтриаксон + тазобактам 1,125 г	2,250 г/сут 2 раза в день 7 дней	+	+	+	+	+	2,250 г/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально
Метамизол натрия	таблетки 500 мг раствор для инъекций 250 мг/ мл; 500 мг/мл	+	+	+	+	+	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально
Парацетамол	таблетки 200 мг; 500 мг суспензия 120 мг/5 мл сироп 2,4% 40 мл; 50 мл; 60 мл; 90 мл; 100 мл свечи 50 мг; 100 мг; 125 мг; 250 мг раствор для инфузий 10 мг/мл 200 мг/ 20 мл; 1000 мг/ 100 мл	+	+	+	+	+	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально
Диклофенак	25 мг; 46,5 мг; 50 мг; 75 мг; 100 мг таблетки 75 мг; 100 мг капсулы 25 мг/мл; 75 мг/3 мл; 1 мл; 3 мл раствор для инъекций	+	+	+	+	+	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально
Кетопрофен	50 мг/мл; 100 мг/2 мл раствор для инъекции 50 мг; 100 мг; 150 мг; 200 мг капсулы 100 мг; 150 мг форте таблетки 100 мг ректальные свечи	+	+	+	+	+	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально

Ибупрофен	200 мг; 400 мг; 800 мг таблетки 200 мг; 300 мг; 400 мг капсулы 100 мг/5 мл; 200 мг/5мл; 60 мл; 100 мл; 120 мл; 150 мл; 200 мл суспензия 400 мг/4 мл 4 мл; 800 мг/8 мл 8 мл раствор для инфузии 100 мг/5 мл сироп 60 мг, 125 мг свечи	+	+	+	+	+	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально
Декскетопрофен	25 мг таблетки 25 мг/2 мл; 50 мг/ 2мл раствор для инъекций	+	+	+	+	+	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально
Мелоксикам	7,5 мг; 15 мг таблетки 10 мг/1,5 мл; 15 мг/1,5 мл; 5 мг/мл 3 мл раствор для инъекции 7,5 мг; 15 мг свечи	+	+	+	+	+	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально
Кеторолак	7,5 мг; 10 мг таблетки 30 мг/мл 1 мл; 2 мл раствор для инъекции	+	+	+	+	+	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально

Лечебные мероприятия (дополнительное медикаментозное лечение)		По уровню и виду плановой медицинской помощи					Средняя суточная дозировка	Дозировка на один курс
		Амбулаторное лечение		Стационарное лечение				
Международное незапатентованное название препарата	Дозировка и применение препарата	ПСВ	СП/МПЦП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
Метоклопрамид	10 мг таблетки 0,5% 2 мл раствор для инъекций	-	-	+	+	+	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.

(ПЛАНОВОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

При данной нозологии хирургическое вмешательство не применяется

(ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ/ДИЕТА)

При данной нозологии специфической диеты нет

ЭКСТРЕННАЯ (СКОРАЯ) МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРОМ НЕОСЛОЖНЁННОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ

Диагностические мероприятия	Название медицинских услуг	По уровню оказания экстренной медицинской помощи					Минимальное количество услуг или обследований	Продолжительность лечения
		Амбулаторное лечение		Стационарное лечение *				
		СМП/ дома	СП/ ПСВ/ МПЦП	Межрайонный центр скорой медицинской помощи	Региональный филиал РСНПМЦ-ЭМП	РСНПМЦЭМП		
Консультация главного специалиста (врача)	1. Жалобы и анамнез. 2. Объективный осмотр 3. Физико-клинический осмотр.	врач бригады 103 / фельдшер	Семейный врач/ уролог	Хирург	Уролог	Уролог	1	Пока экстренная ситуация не закончится
Примечание. При выявлении сопутствующих заболеваний при обследовании пациента проводятся дополнительные консультации специалистов согласно показаниям на уровне медицинских учреждений.								
Консультация дополнительных специалистов	1. Жалобы и анамнез. 2. Объективный осмотр 3. Физико-клинический осмотр.	-	Гинеколог, эндокринолог, инфекционист, нефролог	Гинеколог, эндокринолог, инфекционист, нефролог	Гинеколог, эндокринолог, инфекционист, нефролог	Гинеколог, эндокринолог, инфекционист, нефролог	1	Пока экстренная ситуация не закончится
Примечание. При выявлении сопутствующих заболеваний при обследовании пациента проводятся дополнительные консультации специалистов согласно показаниям на уровне медицинских учреждений.								
Основные лабораторные исследования	1. Общий анализ крови	+	+	+	+	+	2	
	2. Общий анализ мочи	+	+	+	+	+	2	
	3. Биохимический анализ крови	+	+	+	+	+	1	
	4. Коагулограмма	-	-	-	+	+	1	
	5. Реакция Вассермана (RW)	-	-	+	+	+	1	
	6. Определение HBsAg	-	-	+	+	+	1	
	7. Определение ВИЧ	-	-	+	+	+	1	

	8. Определение AntiHCV	-	-	+	+	+	1	
	9. Определение группы крови	-	-	+	+	+	1	
	10. Бактериологическое исследование мочи	-	-	+	+	+	1	

Примечание: При выявлении сопутствующих заболеваний при осмотре больного проводятся дополнительные лабораторные исследования по показаниям, основанным на уровне медицинских учреждений.

Дополнительные лабораторные исследования	1. Прокалцитонин	-	-	-	+	+	1	
	2. Определение уровня глюкозы в крови	+	+	+	+	+	1	

Примечание: При выявлении сопутствующих заболеваний при осмотре больного проводятся дополнительные обследования по показаниям, основанным на уровне медицинских учреждений.

Основные инструментальные исследования	1. УЗИ почек	-	+	+	+	+	1	
	2. УЗИ мочевого пузыря	-	+	+	+	+	2	

Примечание: При выявлении сопутствующих заболеваний при осмотре больного проводятся дополнительные обследования по показаниям, основанным на уровне медицинских учреждений.

Дополнительные инструментальные исследования	1. Обзорная рентгенография	-	+	+	+	+	1	
	2. Экскреторная урография	-	-	+	+	+	1	
	3. МКСТ почек	-	-	+	+	+	1	
	4. МКСТ с контрастом	-	-	+	+	+	1	
	5. ЭКГ	+	+	+	+	+	1	

Примечание: При выявлении сопутствующих заболеваний при осмотре больного проводятся дополнительные обследования по показаниям, основанным на уровне медицинских учреждений.

СМП – скорая медицинская помощь; СП – семейная поликлиника; ПСВ – пункт семейного врача; МПЦП – многопрофильная центральная поликлиника; РСНПМЦЭМП – Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр экстренной медицинской помощи

*** ПОКАЗАНИЯ К ЭКСТРЕННОЙ ГОСПИТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ:**

Экстренная госпитализация рекомендуется когда неосложнённый пиелонефрит переходит в осложнённый пиелонефрит:

- Тяжелые осложнения. Пациенты с острым неосложненным пиелонефритом, развившим гидронефроз, сепсис, острой почечной недостаточностью или другими тяжелыми осложнениями, требующими немедленного медицинского вмешательства и наблюдения.

- Необходимость немедленного лечения. Пациенты с выраженными симптомами и быстро прогрессирующими клиническими признаками, требующими немедленного начала антибиотикотерапии и других медицинских процедур.
- Невозможность обеспечения безопасности пациента. В случае, когда безопасность пациента не может быть обеспечена в амбулаторных условиях из-за тяжести состояния или наличия социальных или психологических факторов, требующих наблюдения в стационаре.

(МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Лечебные мероприятия (основное медикаментозное лечение)		По уровню и виду плановой медицинской помощи					Средняя суточная дозировка	Дозировка на один курс
		Амбулаторное лечение		Стационарное лечение				
Международное незапатентованное название препарата	Дозировка и применение препарата	СМП/ дома	СП/ ПСВ/ МПЦ П	Межрайонный центр скорой медицинской помощи	Региональный филиал РСНПМЦ-ЭМП	РСНПМЦ-ЭМП		
Офлоксацин 400мг	400-800 мг/сут 2 раза в день 7-14 дней	+	+	+	+	+	400-800 мг/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.
Ципрофлоксацин 500 мг	500 мг/сут 2 раза в день 7-14 дней	+	+	+	+	+	1000 мг/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.
Левифлоксацин 500 мг	500 мг/сут 1 раз в день 7-14 дней	+	+	+	+	+	500 мг/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.
Моксифлоксацин 400 мг	400 мг/сут 1 раз в день 7-14 дней	+	+	+	+	+	400 мг/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.

Сульфометаксазол/Триметаприм 400+80 мг	0,4-2,0 г/сут 2 раза в день 7-14 дней	+	+	+	+	+	0,4-2,0 г/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.
Амикацин 0,5 г	7,5 мг/кг каждые 12 часов в течении 10 дней	+	+	+	+	+	15 мг/кг/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.
Пиперациллин + тазобактам 4,5 г	13,5 мг/сут 3 раза в день в течении 7 дней	+	+	+	+	+	13,5 мг/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.
Ампициллин + сульбактам 1,5 г	3 г/сут 2 раза в день 7 дней	+	+	+	+	+	3 г/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.
Амоксициллин / клавуланат 625 мг	1875 мг/сут 3 раза в день 7 дней	+	+	+	+	+	1875 мг/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.
Цефуроксим 1,0 г	2,0 г/сут 2 раза в день 7 дней	+	+	+	+	+	2,0 г/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.
Цефотаксим 1,0 г	2,0 г/сут 2 раза в день 7 дней	+	+	+	+	+	2,0 г/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.
Цефоперазон 1,0 г	2,0 г/сут 2 раза в день 7 дней	+	+	+	+	+	2,0 г/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.

Цефтриаксон 1,0 г	2,0 г/сут 2 раза в день 7 дней	+	+	+	+	+	2,0 г/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.
Цефтазидим 1,0 г	2,0 г/сут 2 раза в день 7 дней	+	+	+	+	+	2,0 г/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.
Цефоперазон + сульбактам 1,0 г + 0,5 г или 1,0 г	2,0 г/сут 2 раза в день 7 дней	+	+	+	+	+	2,0 г/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.
Цефепим 1,0 г	2,0 г/сут 2 раза в день 7 дней	+	+	+	+	+	2,0 г/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.
Цефтриаксон + тазобактам 1,125 г	2,250 г/сут 2 раза в день 7 дней	+	+	+	+	+	2,250 г/сут	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.
Метамизол натрия	таблетки 500 мг раствор для инъекций 250 мг/мл; 500 мг/мл	+	+	+	+	+	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.
Парацетамол	таблетки 200 мг; 500 мг суспензия 120 мг/5 мл сироп 2,4% 40 мл; 50 мл; 60 мл; 90 мл; 100 мл свечи 50 мг; 100 мг; 125 мг; 250 мг раствор для	+	+	+	+	+	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.

	инфузий 10 мг/мл 200 мг/ 20 мл; 1000 мг/ 100 мл							
Диклофенак	25 мг; 46,5 мг; 50 мг; 75 мг; 100 мг таблетки 75 мг; 100 мг капсулы 25 мг/мл; 75 мг/3 мл; 1 мл; 3 мл раствор для инъекций	+	+	+	+	+	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.
Кетопрофен	50 мг/мл; 100 мг/2 мл раствор для инъекции 50 мг; 100 мг; 150 мг; 200 мг капсулы 100 мг; 150 мг форте таблетки 100 мг ректальные свечи	+	+	+	+	+	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.
Ибупрофен	200 мг; 400 мг; 800 мг таблетки 200 мг; 300 мг; 400 мг капсулы 100 мг/5 мл; 200 мг/5мл; 60 мл; 100 мл; 120 мл; 150 мл; 200 мл суспензия 400 мг/4 мл 4 мл; 800 мг/8 мл 8 мл раствор для инфузии 100 мг/5 мл сироп 60 мг, 125 мг	+	+	+	+	+	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.

	свечи							
Декскетопрофен	25 мг таблетки 25 мг/2 мл; 50 мг/ 2мл раствор для инъекций	+	+	+	+	+	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.
Мелоксикам	7,5 мг; 15 мг таблетки 10 мг/1,5 мл; 15 мг/1,5 мл; 5 мг/мл 3 мл раствор для инъекции 7,5 мг; 15 мг свечи	+	+	+	+	+	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.
Кеторолак	7,5 мг; 10 мг таблетки 30 мг/мл 1 мл; 2 мл раствор для инъекции	+	+	+	+	+	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.

Лечебные мероприятия (дополнительное медикаментозное лечение)		По уровню и виду плановой медицинской помощи					Средняя суточная дозировка	Дозировка на один курс
		Амбулаторное лечение		Стационарное лечение				
Международное незапатентованное название препарата	Дозировка и применение препарата	СМП/ дома	СП/ ПСВ/ МПЦП	Межрайон- ный центр скорой медицинской помощи	Региональ- ный филиал РСНПМЦ- ЭМП	РСНПМЦ- ЭМП		
Метоклопрамид	10 мг таблетки 0,5% 2 мл раствор для инъекций	-	-	+	+	+	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.

(ЭКСТРЕННОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

При данной нозологии хирургическое вмешательство не применяется

(ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ/ДИЕТА)

При данной нозологии специфической диеты нет

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Мероприятия по проведению диспансеризации	Название медицинских услуг	ПСВ/СП	МПЦП	Минимальное количество	Период диспансерного наблюдения
Консультация специалиста (врача)	Осмотр врача	+	+	1	1 месяц
Примечание. При излечивании больного от острого неосложнённого пиелонефрита по клиническим и лабораторным показателям проводится наблюдение до 1 месяца					
Лабораторное исследования	1. Общий анализ мочи	+	+	1	1 месяц
Примечание: Через 1 месяц у больных проводят общий анализ мочи					
Инструментальные исследования	1. УЗИ почек	+	+	1	По показанием
Примечание. По показанием проводят УЗИ почек.					

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Специфических реабилитационных мероприятий нет

ПРОФИЛАКТИКА

Мероприятия по проведению профилактики	Название медицинских услуг	ПСВ/СП	МПЦП	Минимальное количество	Период профилактики
Консультация специалиста (врача)	Осмотр врача.	+	+	1	По показаниям
Примечание: После лечения острого неосложнённого пиелонефрита проводят первичную и вторичную профилактику заболевания. Профилактические мероприятия применяются у больных в группе риска.					
Лабораторное исследования	1. Общий анализ мочи	+	+	1	По показаниям
Примечание. При остром неосложнённом пиелонефрите для скрининг возможно применение общего анализа мочи.					