

Приложение  
к приказу № 180  
от «23» июня 2025 года  
Министерства здравоохранения  
Республики Узбекистан

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УРОЛОГИИ**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО  
НОЗОЛОГИИ УРЕТРИТ**

**ТАШКЕНТ-2025**

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор Республиканского специализированного  
научно-практического центра урологии  
Д.Т. Мухтаров



2025г

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ  
УРЕТРИТ**

**ТАШКЕНТ-2025**

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ

## УРЕТРИТ

### НАЗВАНИЕ (КОД) НОЗОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КЛИНИЧЕСКОГО СТАНДАРТА, СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ

Кодирование по МКБ-10/11:	Нозологическое наименование:	Специалисты, привлекаемые для диагностики и лечения нозологии в амбулаторных условиях:		Специалисты, привлекаемые для диагностики и лечения нозологии в стационарных условиях:	
		Основной контролирующий специалист:	Дополнительно привлекаемые специалисты:	Основной контролирующий специалист:	Дополнительно привлекаемые специалисты:
По МКБ-10:					
N34	<b>Уретрит</b>	Уролог, Семейный врач	Дермато- венеролог	Уролог	Дермато- венеролог
По МКБ-11:					
<b>GС02</b>	<b>Уретрит</b>				

**Плановые мероприятия по диагностике, лечению, реабилитации и диспансеризации при уретрите:**

Диагностическое мероприятие:	Наименование медицинских услуг:	По уровню и виду плановой медицинской помощи:					Минимальное количество предоставляемых услуг или проводимых обследований	Срок лечения
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь*				
		СВП	СП/МСП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
<b>Консультация основного специалиста (врача)</b>	1. Жалобы и анамнез 2. Объективный осмотр 3. Физикальное и клиническое обследование	СВ	СВ/Уролог	Уролог	Уролог	Уролог	2	Срок лечения: в зависимости от обращения Продолжительность лечения: до 1 месяца
<b>Примечание:</b> В случаях отсутствия специалиста в районе пациенты направляются в соседний район.								
<b>Консультация специалиста (врача) (дополнительно)</b>	1. Жалобы и анамнез 2. Объективный осмотр 3. Физикальное и клиническое обследование	-	Дермато-венеролог	Дерматовенеролог	Дерматовенеролог	Дерматовенеролог	1	Срок лечения: в зависимости от обращения Продолжительность лечения: до 1 месяца
<b>Примечание:</b> При выявлении сопутствующих заболеваний во время осмотра пациента, консультации дополнительных специалистов проводятся в соответствии с уровнем медицинского учреждения и показаниями.								
<b>Основные лабораторные исследования</b>	1. Общий анализ крови	+	+	+	+	+	<b>1</b>	
	2. Мазок из уретры	+	+	+	+	+	<b>2</b>	
	3. Общий анализ мочи	+	+	+	+	+	<b>2</b>	
	4. Биохимический	+	+	+	+	+	<b>1</b>	

	анализ крови							
	5. Коагулограмма	-	-	-	+	+	<b>1</b>	
	6. Реакция Вассермана (RW)	-	-	+	+	+	<b>1</b>	
	7. Определение HBsAg	-	-	+	+	+	<b>1</b>	
	8. Определение ВИЧ	-	-	+	+	+	<b>1</b>	
	9. Определение Anti-HCV	-	-	+	+	+	<b>1</b>	
	10. Определение группы крови	-	-	+	+	+	<b>1</b>	
	11. Бактериологический посев мочи	-	-	+	+	+	<b>2</b>	
<b>Примечание:</b> При выявлении сопутствующих заболеваний во время осмотра пациента, дополнительные исследования проводятся в соответствии с уровнем медицинского учреждения и показаниями.								
<b>Дополнительные лабораторные исследования</b>	1. Прокальцитонин	-	-	-	+	+	<b>1</b>	
	2. Определение уровня глюкозы в крови	+	+	+	+	+	<b>1</b>	
<b>Примечание:</b> При выявлении сопутствующих заболеваний во время осмотра пациента дополнительные исследования проводятся в соответствии с уровнем медицинского учреждения и показаниями.								
<b>Основные инструментальные исследования</b>	1. УЗИ почек	-	+	+	+	+	<b>1</b>	
	2. УЗИ мочевого пузыря	-	+	+	+	+	<b>1</b>	
<b>Примечание:</b> При выявлении сопутствующих заболеваний во время осмотра пациента, дополнительные исследования проводятся в соответствии с уровнем медицинского учреждения и показаниями.								
<b>Дополнительный</b>	1. Общая	-	+	+	+	+	<b>1</b>	

<b>ые инструменталь ные исследования</b>	рентгенография (рентгеноскопия)							
	2. Экскреторная урография	-	+	+	+	+	<b>1</b>	
	3. КТ почек	-	+	+	+	+	<b>1</b>	
	4. Уретроцистоскопи я	-	-	+	+	+	<b>1</b>	
	5. Контрастная КТ	-	-	+	+	+	<b>1</b>	
	6. Электрокардиогра фия (ЭКГ)	-	-	+	+	+	<b>1</b>	

***Примечание:** При выявлении сопутствующих заболеваний во время осмотра пациента, дополнительные исследования проводятся в соответствии с уровнем медицинского учреждения и показаниями*

СВП – семейный врачебный пункт, СП – семейная поликлиника, МСП – многопрофильная семейная поликлиника, СВ – семейный врач, СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита, УЗИ – ультразвуковое исследование, МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография, Эхо-КГ – эхокардиография

**ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ:**

При данной патологии стационарное лечение не проводится.

**(МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)**

Лечебные мероприятия (основное медикаментозное лечение)		По уровню и виду плановой медицинской помощи					Средняя суточная дозировка	Курсовая дозировка
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь				
Название лекарственного средства (международное непатентованное наименование)	Дозировка и применение	СВП	СП/МСП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
Цефтриаксон	1,0 г, два раза в сутки, раствор для инъекций, от 7 дней	+	+	+	+	+	2 г/сут	12-14 г
Цефотаксим	1,0 г, два раза в сутки, раствор для инъекций, от 7 дней	+	+	+	+	+	2 г/сут	12-14 г
Цефуроксим	1,0 г, два раза в сутки, раствор для инъекций, от 7 дней	+	+	+	+	+	2 г/сут	12-14 г
Цефоперазон	1,0 г, два раза в сутки, раствор для инъекций, от 7 дней	+	+	+	+	+	2 г/сут	12-14 г
Цефоперазон + Сульбактам	2,0 г, два раза в сутки, раствор для инъекций, от 7 дней	+	+	+	+	+	4 г/сут	22-24 г
Пивмециллинам	400 мг, три	+	+	+	+	+	400 мг/сут	Дозировка и

	раза в сутки, 3-5 дней							способ введения индивидуально
Офлоксацин	400-800 мг/сут, два раза в сутки, 7-14 дней	+	+	+	+	+	400-800 мг/сут	Дозировка и способ введения индивидуально
Ципрофлоксацин	500-1000 мг/сут, два раза в сутки, 7-14 дней	+	+	+	+	+	500-1000 мг/сут	Дозировка и способ введения индивидуально
Левифлоксацин	500 мг/сут, один раз в сутки, 7-14 дней	+	+	+	+	+	500 мг/сут	Дозировка и способ введения индивидуально
Моксифлоксацин	400 мг/сут, один раз в сутки, 7-14 дней	+	+	+	+	+	400 мг/сут	Дозировка и способ введения индивидуально
Сульфаметоксазол / Триметоприм (400+80 мг)	0,4-2,0 г/сут, два раза в сутки, 7-14 дней	+	+	+	+	+	0,4-2,0 г/сут	Дозировка и длительность лечения индивидуальны
Цефиксим	400 мг, один раз в сутки, 3-5 дней	+	+	+	+	+	400 мг/сут	Дозировка и способ введения индивидуально
Натрия метамизол	Таблетки 500 мг, раствор для инъекций 250 мг/мл; 500 мг/мл	+	+	+	+	+	Дозировка и способ введения индивидуально	Дозировка и способ введения индивидуально
Парацетамол	Таблетки 200 мг; 500 мг, суспензия 120 мг/5 мл, сироп 2,4% (разные	+	+	+	+	+	Дозировка и способ введения индивидуально	Дозировка и способ введения индивидуально

	объемы), свечи (50-250 мг), раствор для инфузий 10 мг/мл							
Диклофенак	Таблетки (25- 100 мг), капсулы (75- 100 мг), раствор для инъекций (25 мг/мл; 75 мг/3 мл)	+	+	+	+	+	Дозировка и способ введения индивидуально	Дозировка и способ введения индивидуально
Кетопрофен	Раствор для инъекций (50 мг/мл; 100 мг/2 мл), капсулы (100-200 мг), форте таблетки (100-150 мг), ректальные свечи (100 мг)	+	+	+	+	+	Дозировка и способ введения индивидуально	Дозировка и способ введения индивидуально
Ибупрофен	Таблетки (200-800 мг), капсулы (200-400 мг), суспензия (100-200 мг/5 мл), инфузионный раствор (400- 800 мг), сироп, свечи	+	+	+	+	+	Дозировка и способ введения индивидуально	Дозировка и способ введения индивидуально
Декскетопрофен	Таблетки 25 мг, раствор	+	+	+	+	+	Дозировка и способ	Дозировка и способ

	для инъекций (25 мг/2 мл; 50 мг/2 мл)						введения индивидуально	введения индивидуально
Мелоксикам	Таблетки (7,5 мг; 15 мг), раствор для инъекций (10-15 мг), свечи (7,5-15 мг)	+	+	+	+	+	Дозировка и способ введения индивидуально	Дозировка и способ введения индивидуально
Кеторолак	Таблетки (7,5 мг; 10 мг), раствор для инъекций (30 мг/мл, 1-2 мл)	+	+	+	+	+	Дозировка и способ введения индивидуально	Дозировка и способ введения индивидуально
Выбор антибактериальных препаратов указан в национальном клиническом протоколе по нозологии «Уретрит»								

Лечебные мероприятия (дополнительная медикаментозная терапия)		По уровню и виду плановой медицинской помощи					Средняя суточная дозировка	Курсовая дозировка
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь				
		СВП	СП/МСП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
Название лекарственного средства (международное непатентованное наименование)	Дозировка и применение							
Метоклопрамид	Таблетки 10 мг, раствор для инъекций 0,5% 2 мл	-	-	+	+	+	Дозировка и способ введения индивидуально	Дозировка и способ введения индивидуально

### (ПЛАНОВАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ)

В данной нозологии хирургическое вмешательство не проводится.

### (ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ / ДИЕТА)

В данной нозологии специальная диетическая методика отсутствует.

### ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УРЕТРИТЕ

В данной нозологии экстренная медицинская помощь не оказывается.

### ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ.

(Диспансеризация пациентов, взятых под "Д" наблюдение)

Название медицинской услуги	Название медицинской услуги	Название медицинской услуги	Название медицинской услуги	Минимальное количество мероприятий	Срок профилактики
Консультация специалиста (врача)	Осмотр врача	+	+	1	1 месяц
<b>Примечание:</b> Пациенты находятся под наблюдением до 1 месяца после клинического и лабораторного выздоровления от острого цистита.					
Лабораторные исследования	1. Анализ мочи	+	+	1	1 месяц
<b>Примечание:</b> У пациентов через 1 месяц после выздоровления проводится однократный анализ мочи.					

### РЕАБИЛИТАЦИЯ.

Специфические реабилитационные мероприятия отсутствуют.

### ПРОФИЛАКТИКА

Профилактические мероприятия	Наименование медицинских услуг	СВП/СП	МСП	Минимальное количество мероприятий	Срок профилактики
Консультация специалиста (врача)	Осмотр врача	+	+	1	По показаниям

**Примечание:** При уретрите после амбулаторного лечения заболевания проводятся первичные и вторичные профилактические мероприятия. Эти профилактические мероприятия применяются только у пациентов, относящихся к группе риска.

<b>Лабораторные исследования</b>	1. Анализ мочи	+	+	1	По показаниям
----------------------------------	----------------	---	---	---	---------------

**Примечание:** При проведении скрининга на уретрит может использоваться анализ мочи.