

**Приложение
к приказу № 180
от «23» июня 2025 года
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан**

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ПО НОЗОЛОГИИ
«ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ»**

ТАШКЕНТ 2025



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ПО НОЗОЛОГИИ
«ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ»**

ТАШКЕНТ 2025

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ НОЗОЛОГИИ НАИМЕНОВАНИЕ (КОД), ДИАГНОСТИКА И ИМЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЕЧЕНИЕМ

Кодирование по ХКТ-10/11:	Нозологическое название:	Специалисты, привлекаемые по нозологии для диагностики и лечения в амбулаторных условиях		Специалисты, занимающиеся нозологиями для стационарной диагностики и лечения	
		Главный курирующий специалист	Дополнительные специалисты, которые будут привлечены	Главный курирующий специалист	Дополнительные специалисты, которые будут привлечены
S02.6	ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ	Хирург - стоматолог Челюстно-лицевой хирург	Невропатолог Терапевт - стоматолог	Челюстно-лицевой хирург	В случае сопутствующих заболеваний привлекается узкий круг специалистов.
S02.60	Перелом нижней челюсти	Хирург - стоматолог Челюстно-лицевой хирург	Терапевт - стоматолог	Челюстно-лицевой хирург	В случае сопутствующих заболеваний с привлекается узкий круг специалистов.
S02.61	Перелом альвеолярного отростка нижней челюсти	Хирург - стоматолог Челюстно-лицевой хирург	Невропатолог Терапевт - стоматолог	Челюстно-лицевой хирург	В случае сопутствующих заболеваний с привлекается узкий круг специалистов.
S02.62	Перелом тела нижней челюсти	Хирург - стоматолог Челюстно-лицевой хирург	Невропатолог Терапевт - стоматолог	Челюстно-лицевой хирург	В случае сопутствующих заболеваний с привлекается узкий круг специалистов.
S02.63	Перелом мышечного отростка	Хирург - стоматолог	Невропатолог Терапевт - стоматолог	Челюстно-лицевой хирург	В случае сопутствующих

		Челюстно-лицевой хирург			заболеваний с привлекается узкий круг специалистов.
S 02.64	Перелом венечного отростка	Хирург - стоматолог Челюстно-лицевой хирург	Невропатолог Терапевт - стоматолог	Челюстно-лицевой хирург	В случае сопутствующих заболеваний с привлекается узкий круг специалистов.
S02.65	Перелом ветви	Хирург - стоматолог Челюстно-лицевой хирург	Невропатолог Терапевт - стоматолог	Челюстно-лицевой хирург	В случае сопутствующих заболеваний с привлекается узкий круг специалистов.
S02.66	Перелом симфиза (срединный)	Хирург - стоматолог Челюстно-лицевой хирург	Невропатолог Терапевт - стоматолог	Челюстно-лицевой хирург	В случае сопутствующих заболеваний с привлекается узкий круг специалистов.

ОКАЗАНИЕ СКОРОЙ И ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ НОЗОЛОГИИ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Диагностические мероприятия	Название медицинских услуг	По уровню и виду скорой и неотложной медицинской помощи					Минимальное количество сервисов или проверок	Продолжительность лечения
		Амбулаторное лечение			Стационарная поддержка*			
		ОП/ОПП	КТМП	Республика Каракалпакстан, г.Ташкент, ТДСИ и Областные стоматологические поликлиники	Республика Каракалпакстан, Областная многопрофильная взрослая больница; Отделение челюстно-лицевой хирургии	Клиника Ташкентского государственного стоматологического института; Кафедра челюстно-лицевой хирургии		
консультация специалиста (хирурга стоматолога, челюстно-лицевого хирурга).	1. Жалобы и анамнез (сбор анамнеза заболеваний и жизни)	+	+	+	+	+	Один раз	До выздоровления от болезни в случае обращения по болезни
	2. Объективное обследование	+	+	+	+	+	Один раз	
	3. Физикальное и клиническое обследование.	+	+	+	+	+	Один раз	
Примечание: -в случае наличия у пациента дополнительных других или сопутствующих заболеваний согласно инструкции возможно обследование у других соответствующих специалистов;								
Консультация специалиста (стоматолога-терапевта) (добавление)	Проводить терапевтическую санацию	-	+	+	+	+	Один раз	
Примечание: (согласно инструкции)								
лабораторные анализы	1.Общий (клинический) анализ крови		+	+	+	+	Один раз	

	2.Индикатор свертываемости крови			+	+		+	+	Один раз	
Примечание: Лабораторные исследования можно повторить по рекомендации узкого специалиста или при наличии показаний в процессе лечения.										
Дополнительные лабораторные анализы Согласно инструкции	1. Определение количества сахара			+	+		+	+	Один раз	
	2.Гепатит «С» и «В»			+	+		+	+	Один раз	
	3.Тестирование на СПИД и RW			+	+		+	+	Один раз	
Примечание: (согласно инструкции)										
Основные инструментальные исследования	1.Рентгенологическое исследование зуба на линии перелома			+	+		+	+	Один раз	
Примечание: Инструментальные исследования можно повторить по рекомендации узкого специалиста или при наличии показаний в процессе лечения.										
Дополнительные инструментальные исследования	1.УЗИ кость вокруг зубов				+		+	+	Один раз	
	2.Определение чувствительности микроба к антибиотик				+		+	+	Один раз	
Примечание: При выявлении у пациента сопутствующих заболеваний могут быть проведены имеющиеся дополнительные и повторные инструментальные диагностические исследования на уровне медицинских учреждений.										
*НАПРАВЛЕНИЕ НА СРОЧНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ: (инструкции по стационарному лечению, которые появляются при амбулаторном лечении, написаны здесь) районный уровень - Острое воспалениеесли процесс диффузный и коморбидный, его направляют в отделение челюстно-лицевой хирургии области, так как челюстно-лицевого отделения в районе нет.; региональный уровень и республиканский уровень - Острое воспалениеесли процесс диффузный и коморбидный, больного лечат в областном отделении челюстно-лицевой хирургии..										
Диагностические мероприятия	Название медицинских услуг	По уровню и виду скорой и неотложной помощи						Минимальное количество сервисов или проверок	Продолжительность лечения	
		Амбулаторное лечение		Стационарная поддержка*						
		ТТУо/ дома	ОП/ ОШП/ КТМП	Межрайонный центр скорой медицинской помощи	Республика Каракалпакстан, Областная многопрофильная взрослая больница; Отделение челюстно-лицевой хирургии	Кафедра челюстно-лицевой хирургии Ташкентского государственного стоматологического института				
Другие виды проверок	1.Рентгенологическое исследование			+			+	+	Один раз	Один день
	2.УТТ кость			+			+	+	Один раз	Один день
	3.МСКТ			+			+	+	Один раз	Один день
Примечание: (согласно инструкции)										

(МЕДИЦИНСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Лечебные мероприятия(основной медикамент)	Дозировка и способ применения препарата	По уровню и виду скорой и неотложной помощи						Средняя суточная дозировка	Дозировка на один курс
		Амбулаторное лечение		Стационарная поддержка*					
		ТТУо/ дома	ОП/ ОШП/	Республика Каракалпакстан, Областная многопрофильная взрослая больница; Отделение челюстно-лицевой хирургии	Кафедра челюстно-лицевой хирургии Ташкентского государственного стоматологического института				

Амоксициллин + клавулановая кислота	Таб. 250-500 мг Суспензия 100 мл (125/5 мл); (250/5 мл) (количество амоксациллина) выпить 45-90 мг/кг/молоко, 2- 3 раза/молоко м/детям - 50 мг/кг/сут 2 раза.	+	+	+	+	250-500мг 3 раза в день, 5-6-7 дней.	7500-10000 мг
Азитромицин	Таб. 250 мг, 500 мг; 1 таб выпить. 1 раз в день. Суспензия 15 мл (100 мг/5 мл) 10 мг/кг 1 раз в день детям 6 месяцев.	+	+	+	+	1 таб 1 максимум 3-6 дней	Таблица 3–6
Роксибель	Таб. 150 мг Взрослым 1 таб. выпить 2 раза. Детям 5-8 мг/кг/сут 1 раз.	+	+	+	+	1 таб 2 магал 5 дней	10 таблеток
(Нью- Йорк)Кетопрофен	Таблетка 100 мг - пить - 1-2 раза в день. По 2 мл 50мг/мл в ампуле - п/о, в/и - 1-2 раза в день.	+	+	+	+	3 колпачка. 2 стола. 1 стол. 1 ампер.	Короткое время используется для облегчения боли.
(Нью-Йорк) Парацетамол + Диклофенак натрия	Таблетки 50–100 мг — Взрослым и детям старше 14 лет — по 1 таб. 2-3 раза в день, после еды	+	+	+	+	3 стола. 2 стола. 1 стол.	Короткое время используется для облегчения боли.

(Нью-Йорк)Ибупрофен	Таблетки по 200 мг - пить - 2-3 раза в день. Суспензия 100 мл (100 мг/5 мл) Разовая доза для детей 10 мг/кг 2-3 раза в день.	+	+	+	+	3 стола. 2 стола. 1 стол.	Короткое время используется для облегчения боли.
(Нью-Йорк)Нимесулид	Таблетка 100 мг, суспензия 100 мг/2 г, гранулы для питья - для питья - 2 раза в день.	+	+	+	+	2 супп.	Короткое время используется для облегчения боли.
Антисептические растворы	Промыть операционную и прополоскать рот.	+	+	+	+	200 мл	Используется для хирургического лечения.

Примечание:

Лечебные мероприятия(добавление медикамент)		По уровню и виду скорой и неотложной медицинской помощи				Средняя суточная дозировка	Дозировка на один курс
		Амбулаторное лечение		Стационарная поддержка*			
Лекарства (международно непатентованное) название	Дозировка и способ применения препарата	ТТУо/дома	ОП/ОШП/КТМП				
1. Аскорбиновая кислота	Драже 0,05мг, пить по 1-2 кап после еды. 3-5 раз в день	+	+	+	+	3 таблетки	Разжижение крови и улучшение обмена веществ
2. Препараты кальция	Вкладка 1–3 населенных пунктов	+	+	+	+	2-3 таблетки	Противовоспалительное, антигистаминное, устранение дефицита кальция.

Примечание: В национальных клинических протоколах Перечисленные схемы лечения (различные комбинации этих основных и дополнительных препаратов) применяют в зависимости от тяжести заболевания и показаний, по этим протоколам могут быть рекомендованы дополнительные препараты и дополнительные методы.

Разовая доза этих препаратов указывается только в объеме, необходимом для оказания амбулаторной или стационарной помощи в период данного конкретного приступа (вспышки) заболевания.

(НЕОТЛОЖНАЯ И ЭКСТРЕННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ)

Лечебные мероприятия (оперативное лечение)	По уровню и виду скорой и неотложной медицинской помощи				
	Амбулаторное лечение		Стационарная поддержка*		
Название операции/вмешательства/лечения	ОП/ ОШП	КТМП (при наличии врача-стоматолога- хирурга)	Межрайонный центр скорой медицинской помощи	Филиал Региональной скорой медицинской помощи ИИАТМ	Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи МИАТ
1. временная и постоянная иммобилизация челюстей	Совет	+	+	+	+
2. Остеосинтез костных отломков		+	+	+	+
3. Промывание хирургического поля антисептическими растворами.	+	+	+	+	+

Примечание: (вот показание к проведению операции/вмешательства/процедуры)

(ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ/ДИЕТА)

Режим питания	По уровню и виду скорой и неотложной медицинской помощи				
	Амбулаторное лечение		Стационарная поддержка*		
Диетическая таблица и ее продолжительность	ТТУо/ дома	ОП/ ОШП/ КТМП	Межрайонный центр скорой медицинской помощи	Филиал Региональной скорой медицинской помощи ИИАТМ	Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи МИАТ
1. 2– стол, постоянный.	+	+	+	+	+

Примечание: (Инструкции по выписке из стационара/инструкции по плановому переводу в больницу должны быть написаны полностью.)

Пересмотрена лекарственная часть, на основании клинического протокола введены некоторые изменения, отмеченные красным, соответствующие требованиям.