

Приложение 2
к приказу № 180
от «23» июня 2025 года
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
РЕСПУБЛИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И
РЕБЕНКА**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ПО НОЗОЛОГИИ
«ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ РАЗРЫВ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК»**

ТАШКЕНТ – 2025

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор специализированного научно-практического медицинского центра
здоровья матери и ребенка
Н.О. Илтифханова



2025 г

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ПО НОЗОЛОГИИ
«ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ РАЗРЫВ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК»**

ТАШКЕНТ – 2025

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ “ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ РАЗРЫВ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК”

ПЛАНОВАЯ ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ И ДИСПАНСЕРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПРПО

Кодирование по МКБ-10/11:	Нозологическое название:	Специалисты, привлекаемые по нозологии для диагностики и лечения в амбулаторных условиях		Специалисты, занимающиеся нозологиями для стационарной диагностики и лечения	
		Главный курирующий специалист	Дополнительные специалисты, которые будут привлечены	Главный курирующий специалист	Дополнительные специалисты, которые будут привлечены
МКБ-10					
O42	Преждевременный разрыв плодных оболочек				
O42.0	Преждевременное излитие околоплодных вод, начало родов в течение ближайших 24 часов.				
O42.2	Преждевременный разрыв плодных оболочек, отсрочка родов в зависимости от лечения				
O42.9	Преждевременный разрыв плодных оболочек неуточненного происхождения				
МКБ-11					
JA89.Z	медицинская помощь матери в связи с неуточненным преждевременным разрывом плодных оболочек				
JA89.3	медицинская помощь матери при преждевременном разрыве плодных оболочек при недоношенной беременности	-	--	Акушер-гинеколог	-
JA89.Y	другая уточненная медицинская помощь матери в связи с преждевременным разрывом плодных оболочек				
JA89.2	медицинская помощь матери при преждевременном разрыве плодных оболочек с медикаментозной остановкой родовой деятельности				
JA89.1	медицинская помощь матери при преждевременном разрыве плодных оболочек и началом родов спустя 24 часа				

JA89.0	медицинская помощь матери при преждевременном разрыве плодных оболочек с последующим началом родов в течение 24 часов				
JA88.1	Инфекция амниотической полости или плодных оболочек, хориоамнионит, осложняющий беременность				

"ПЛАНОВАЯ ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ И ДИСПАНСЕРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО НОЗОЛОГИИ ПРПО

Диагностические мероприятия	Название медицинских услуг	По уровню и виду плановой медицинской помощи					Минимальное количество сервисов или проверок	Продолжительность лечения
		Амбулаторное лечение		Стационарная поддержка*				
		ПСВ	СП/МПЦП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
Основные консультации специалиста (врача)	1. Медицинское обследование (выявление факторов риска)	-	-	акушер-гинеколог			1	С момента преждевременного излития околоплодных вод до родов
	2. Рекомендации по устранению факторов риска	-	-	акушер-гинеколог			1	
Примечание:								
Консультация специалиста (врача) (добавление)	1. Жалобы и анамнез (анамнез болезни и жизни)	-	-	акушер-гинеколог неонатолог			1	С момента преждевременного излития околоплодных вод до родов
	2. Объективный взгляд	-	-	акушер-гинеколог			1	
	3. Физикальное и клиническое обследование	-	-	акушер-гинеколог			1	

	4. Осмотр в зеркалах	-	-	акушер-гинеколог			1
<p>Примечание: (согласно инструкции) в случае наличия у пациента дополнительных других или сопутствующих заболеваний в соответствии с инструкцией он обязан пройти обследование у специалистов других соответствующих узких областей, указанных в Национальных клинических протоколах;</p> <p>- при выявлении заболевания в осложненном состоянии, а также в случаях, когда показано оперативное вмешательство, проводится срочная хирургическая консультация, в зависимости от состояния больного направляют в стационар на стационарное лечение и/или операция.</p>							
Основные лабораторные анализы	1. Общий (клинический) анализ крови	-	-	+	+	+	С момента преждевременного излития околоплодных вод до родов
	2. Общий (клинический) анализ мочи	-	-	+	+	+	
	3. Количество лейкоцитов в крови	-	-	+	+	+	
	4. СРО	-	-	-	-	+	
<p>Примечание: необходимо проведение лабораторных исследований лечащим врачом, а результаты этих анализов направляются на следующий уровень специализированного обследования. Повторное лабораторное обследование проводится только по назначению специалиста или в процессе стационарного лечения.</p>							
Дополнительные лабораторные анализы	При выявлении сопутствующих заболеваний во время консультации пациента проводятся доступные лабораторные исследования на уровне медицинских учреждений.						
Примечание: (согласно инструкции)							
Основные инструментальные исследования	1. УЗИ	-	-	+	+	+	С момента преждевременного излития околоплодных вод до родов
	2. доплер	-	-	-	+	+	
	3. КТГ	-	-	-	-	+	
Примечание:							
Дополнительные инструментальные исследования	При выявлении сопутствующих заболеваний во время консультации пациента проводятся доступные инструментальные диагностические исследования на уровне медицинских учреждений.						
<p>Примечание: (согласно инструкции) Инструментальные диагностические исследования проводятся лечащим врачом. При наличии показаний к лечению в медицинском учреждении другого уровня оно будет направлено вместе с копиями обследования. Инструментальное диагностическое обследование повторяется только по назначению специалиста или в процессе стационарного лечения.</p>							
* ПОКАЗАНИЯ К ГОСПИТАЛЬНОМУ ЛЕЧЕНИЮ: все случаи ПРПО							

(МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Лечебные мероприятия (основные медикаменты)		По уровню и виду скорой и неотложной помощи					Средний суточная дозировка	Дозировка на один курс
		Амбулаторное лечение		Стационарная поддержка*				
Лекарства (международно непатентованное) название	Дозировка и способ применения препарата	ПСВ	СП/МПЦП	Районные (городские) больницы	Медицин-ские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республи- канского уровня		
1. Антибиотики	На основании национального клинического протокола	-	-	Акушер-гинеколог			- До 37 недель: в течение 7–10 дней или до тех пор, пока у женщины не начнутся роды (в зависимости от того, что наступит раньше) - Свыше 37 недель: через 18 часов до родов	На основании национального клинического протокола
2. Кортикостероиды	На основании национального клинического протокола	-	-	Акушер-гинеколог			Дексаметазон 6 мг 1 раз в 12 часов №4 (с 24 по 34,6 нед)	24 мг
3. Токолитики	На основании национального клинического протокола	-	-	Акушер-гинеколог			Нифедипин 10 мг по 1 таб 4 раза в день в течение 2 дней (до 24-34,6 недель)	Индивидуальный подход

Примечание: препараты, перечисленные в национальных клинических протоколах, используются на основании списка лекарств учреждения.

Лечебные мероприятия (дополнительные медикаменты)		По уровню и виду скорой и неотложной медицинской помощи					Средний суточная дозировка	Дозировка на один курс
		Амбулаторное лечение		Стационарная поддержка*				
Лекарства (международно непатентованное) название	Дозировка и способ применения препарата	ПСВ	СП/МПЦП	Районные (городские) больницы	Медицин-ские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республи- канского уровня		
1. Нейропротектор (сульфат магния 25%)	По схеме до 26- 31,6 недель - 1 раз.			Акушер-гинеколог			По схеме до 26- 31,6 недель - 1 раз.	На основании национального клинического протокола
Примечание: на основании перечня лекарственных средства учреждения (в соответствии с инструкцией) используются препараты, включенные в национальные клинические протоколы; если наблюдается осложнение заболевания, препараты корректируют в зависимости от вида осложнения.								

НЕОТЛОЖНАЯ И ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПО НОЗОЛОГИИ "ПРЕЖДЕВРЕСМЕННЫЙ РАЗРЫВ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК»

Диагностические мероприятия	Название медицинских услуг	По уровню и виду скорой и неотложной медицинской помощи					Минимальное количество сервисов или проверок	Продолжительность лечения
		Амбулаторное лечение		Стационарная поддержка*				
		ПСВ	СП/МПЦП	Районные (городские) больницы	Медицин-ские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республи- канского уровня		
Основные консультации специалиста (врача)	1. Акушер- гинеколог	-	-	+	+	+		
	2. Неонатолог	-	-	+	+	+		
Консультация специалиста (врача) (добавление)	1. Анестезиолог- реаниматолог	-	-	+	+	+		
Примечание: (согласно инструкции)								
Основные лабораторные анализы	1. Общий (клинический) анализ крови.	-	-	+	+	+	С момента преждевременного излития околоплодных вод до родов	

	2. Общий (клинический) анализ мочи.	-	-	+	+	+	
	3. Количество лейкоцитов в крови	-	-	+	+	+	
	4. S-реактивный белок (SRB)	-	-	+	+	+	
Примечание:							
Дополнительные лабораторные анализы	1. Прокальцитонин (ПКТ)	-	-	-	-	+	С момента преждевременного излития околоплодных вод до родов
Примечание: (согласно инструкции)							
Основные инструментальные исследования	1. УЗД	-	-	+	+	+	С момента преждевременного излития околоплодных вод до родов
	2. Допплер	-	-	-	+	+	
	3. КТГ	-	-	-	-	+	
*НАПРАВЛЕНИЕ В СТАЦИОНАР СКОРОЙ ПОМОЩИ: Все случаи преждевременного разрыва плодных оболочек							

(МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Лечебные мероприятия (основные медикаменты)		По уровню и виду скорой и неотложной помощи					Средний суточная дозировка	Дозировка на один курс
		Амбулаторное лечение		Стационарная поддержка*				
Лекарства (международно непатентованное) название	Дозировка и способ применения препарата	ПСВ	СП/МПЦП	Районные (городские) больницы	Медицин-ские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
1. Антибиотики	На основании национального клинического протокола	-	-	Акушер-гинеколог			- До 37 недель: в течение 7–10 дней или до тех пор, пока у женщины не начнутся роды (в зависимости	На основании национального клинического протокола

						от того, что наступит раньше) - Свыше 37 недель: через 18 часов до родов	
2. Кортикостероиды	На основании национального клинического протокола	-	-	Акушер-гинеколог		Дексаметазон 6 мг 1 раз в 12 часов №4 (с 24 по 34,6 нед)	24 мг
3. Токोलитики	На основании национального клинического протокола	-	-	Акушер-гинеколог		Нифедипин 10 мг по 1 таб 4 раза в день в течение 2 дней (до 24-34,6 недель)	Индивидуальный подход

Примечание: препараты, перечисленные в национальных клинических протоколах, используются на основании списка лекарств учреждения.

Лечебные мероприятия (дополнительные медикаменты)		По уровню и виду скорой и неотложной медицинской помощи					Средний суточная дозировка	Дозировка на один курс	
		Амбулаторное лечение		Стационарная поддержка*					
Лекарства (международно непатентованное) название	Дозировка и способ применения препарата	ПСВ	СП/МПЦП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня			
1. Нейропротектор (сульфат магния 25%)	По схеме до 26-31,6 недель - 1 раз.						Акушер-гинеколог	По схеме до 26-31,6 недель - 1 раз.	На основании национального клинического протокола

Примечание: на основании перечня лекарственных средства учреждения (в соответствии с инструкцией) используются препараты, включенные в национальные клинические протоколы; если наблюдается осложнение заболевания, препараты корректируют в зависимости от вида осложнения.

(НЕОТЛОЖНАЯ И ЭКСТРЕННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ)

Лечебные мероприятия (оперативное лечение)	По уровню и виду скорой и неотложной медицинской помощи
--	---

Название операции/вмешательства/лечения	Амбулаторное лечение		Стационарная поддержка*		
	ПСВ	СП/МПЦП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня
1. Индукция родов или кесарево сечение (по инструкции)	-	-	+	+	+

ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ/ДИЕТА

При данной нозологии специфической диеты нет

РЕАБИЛИТАЦИЯ

При данной нозологии не предусмотрено

ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

При данной нозологии не предусмотрено