


Приложение 4
к приказу № 180
от «23» июня 2025 года
Министра Здравоохранения
Республики Узбекистан

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПО
НОЗОЛОГИИ «АДГЕЗИВНЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ»**

»УТВЕРЖДАЮ»
Директор Республиканского
Специализированного
научно-практического
центра Оториноларингологии и
заболеваний головы-шеи
У.С.Хасанов.



_____ год

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПО
НОЗОЛОГИИ «АДГЕЗИВНЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ»**

ТАШКЕНТ 2025

Наименование национального стандарта (код), специалисты вовлекаемые для диагностики и лечения по нозологии

Кодирование по МКБ 10/11	Наименование нозологии:	Специалисты, занимающиеся амбулаторной диагностикой по данной нозологии		Специалисты, занимающиеся диагностикой и лечением данной нозологии в условиях стационара	
		Основной специалист	Дополнительные специалисты		
H74.1	Адгезивный средний отит	Семейный врач ЛОР	Невролог Сурдолог	Оториноларинголог	Невролог Сурдолог
AB 17	Адгезивный средний отит				

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДИАГНОСТИКЕ, ЛЕЧЕНИЮ, РЕАБИЛИТАЦИИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПО НОЗОЛОГИИ АДГЕЗИВНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА

Диагностические мероприятия	Наименование медицинских услуг	Виды и степень медицинской помощи					Минимальное количество Медицинских услуг и обследований	Курс лечения
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь				
		СВП/СП	ЦМП	Районная (городская) больница	Областные медицинские учреждения	Республиканские медицинские учреждения		
Основной специалист (врач) консультация	Жалобы и сбор анамнеза	+	+	+	+	+	1	7-10 дней
	Объективный осмотр	+	+	+	+	+	1	7-10 дней
	Физикальные и клинические обследования	+	+	+	+	+	1	7-10 дней
Примечание: Адгезивный отит в основном контролируется и лечится в амбулаторных условиях.								
Специалист дополнительный консультация	1. Жалобы и сбор анамнеза.	+	+	+	+	+	1	7-10 дней
	2. Объективный осмотр	+	+	+	+	+	1	7-10 дней
	3. Физикальное и клиническое обследование	+	+	+	+	+	1	7-10 дней
Примечание: (по показаниям) в случае наличия у пациента дополнительных других или сопутствующих заболеваний по показаниям ему необходимо пройти обследование у других соответствующих специалистов узкого профиля, перечисленных в Национальном клиническом протоколе								
Основной Лабораторные исследования	Основной: Общий анализ крови	+	+	+	+	+	1	7-10 дней
	Общий анализ мочи	+	+	+	+	+	1	7-10 дней

Примечание. При выявлении сопутствующих заболеваний при обследовании больного проводятся дополнительные обследования согласно инструкциям на уровне медицинских учреждений.								
Дополнительные Лабораторные исследования								
Примечание:								
Основные Инструментальные исследования	Отоскопия; Риноскопия; Фарингоскопия	+	+	+	+	+	1	7-10 дней
	Аудиометрия		+	+	+	+	1	7-10 дней
	Тимпанометрия		+	+	+	+	1	7-10 дней
	Рентгенологическое исследование носа и околоносовых пазух		+	+	+	+	1	7-10 дней
Примечание:								
Дополнительные Инструментальные исследования								
	МСКТ височных костей					+		
Примечание: (в соответствии с инструкцией) При выявлении сопутствующих заболеваний во время консультации пациента проводятся доступные инструментальные диагностические исследования с учетом уровня медицинских учреждений.								
ПОКАЗАНИЯ К СТАЦИОНАРНОМУ ЛЕЧЕНИЮ: проводить консервативную терапию при отсутствии условий для ее проведения в амбулаторных условиях; в случае неэффективности первоначального консервативного лечения - для хирургического лечения (при резком снижении слуха)								

(МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Лечебные мероприятия	Виды и степень скорой и экстренной медицинской помощи	Средняя	Курсовая доза
-----------------------------	--	----------------	----------------------

(основные)		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь			суточная доза ЦМП	Районная (городская) больница Название Лекарственных средств (международное непатентованное)
Название Лекарственных средств (международное непатентованное)	Дозировка и применение лекарственных средств	СВП/СП	ЦМП	Районная (городская) больница Название Лекарственных средств (международное непатентованное)	Вилоят даражасидаги тиббийт муассасалари Дозировка и применение лекарственных средств	СВП/СП		
дексаметазон	Для катетеризации (1 ампула на 1 процедуру)	+	+	+	+		4 мг 1 раз в сутки, 5-6-7 дней.	5-6-7 ампула
гидрокортизон	Для катетеризации (1 ампула на 1 процедуру)	+	+	+	+		5 мг 1 раз в день, 5-6-7 дней	5-6-7 ампула
Гиалуронидаза (Лидаза) 64 единица	Для катетеризации (1 ампула на 1 процедуру)	+	+	+	+		64 ед. 1 раз в день, 6-7 дней.	5-6-7 ампула
Кукумазим	Для катетеризации (1 ампула на 1 процедуру)	+	+	+	+		50 ед. - 1 раз в день, 6-7 дней.	5-6-7 ампула
Химотрипсин	Для катетеризации (1 ампула на 1 процедуру)	+	+	+	+		10 мг - 1 раз в день, 6-7 дней.	5-6-7 ампула
Примечание. Для катетеризации используются один или несколько из этих препаратов. На каждую процедуру используется одна ампула одного и того же препарата.								

(ПЛАНОВАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ)

Лечебные мероприятия (оперативное лечение)	По уровню и виду плановой медицинской помощи				
	Амбулаторное лечение		Стационарная помощь		
	ОШП/ОП	КТМП	Районная (городская) больница	Областные медицинские учреждения	Республиканские медицинские учреждения
Название операции/вмешательства/лечения					
1. 1. Тимпаноластика с оссикулопластикой				+	+
2.					
...					
Комментарий: (Операцию проводят при неэффективности медикаментозного лечения, при резком снижении уровня слуха (наблюдается					

тугоухость 2-3 степени). Слуховое протезирование проводят, когда риск возможных осложнений от операции превышает риск или когда пациент не согласен)

(ЛЕЧЕБНАЯ ПИТАНИЕ/ДИЕТА)

Режим питания	По уровню и виду плановой медицинской помощи				
	Амбулатор ёрдам		Стационарная помощь		
	СВП/СП	ЦМП	Районная (городская) больница	Областные медицинские учреждения	Республиканские медицинские учреждения
Диетическая таблица и ее продолжительность					
1. Обеденный стол №15.	+	+	+	+	+
Примечание:					

(ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ)

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТА	Наименование медицинских услуг	СВП/СП	ЦМП	Минимальное количество мероприятий	Длительность диспансерного наблюдения
Консультация специалиста	1. клиническое и физикальное обследование			1 раз в год	До полного излечения болезни
Примечание: Основными курирующими врачами являются семейный врач, сурдолог, оториноларинголог.					
Лабораторные исследования	1. Общий анализ крови			1 раз в год	До полного излечения болезни
Примечание:					
Инструментальные исследования	1.Тимпанометрия			1 раз в год	До полного излечения болезни
	2.Аудиометрия			1 раз в год	До полного излечения болезни а
	3. МСКТ (при необходимости)				
Примечание:					

(РЕАБИЛИТАЦИЯ) Примечание:

(ПЕРВИЧНАЯ, ВТОРИЧНАЯ И ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА/СКРИНИНГ)

Профилактические меры	Название медицинских услуг		СВП/СП	ЦМП	Минимальное количество событий	Реабилитационный период
Консультация эксперта (врача)	1.Отоларинголог		+	+	1 раз в год	1 раз в год
	2.Сурдолог			+	1 раз в год	1 раз в год
	...					
Комментарий:						
Инструментальные исследования	1. Камертональные тесты					
	2. Аудиометрия					
	3.Тимпанометрия					
Комментарий:						
Методы профилактики	1. Для профилактики воспалительных заболеваний среднего уха необходимо исключить или уменьшить влияние вредных факторов:		+	+		
	2. Необходимо полностью или частично восстановить слух и сохранить социальный слух, предотвратить вторичную тугоухость и провести раннюю диагностику:					
	3. снижение и предупреждение возможной инвалидности, улучшение качества жизни, трудоспособности пациента с целью поддержания социальной интеграции пациента в общество: * ежегодное обследование состояния слуха (сурдологическое обследование) и своевременное слухопротезирование при техническом сопровождении;					
Примечание: Профилактика заболеваний носа и полости носа для первичной профилактики.						