

Приложение 4
к приказу № 180
от «23» июня 2025 года
Министра Здравоохранения
Республики Узбекистан

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО
НОЗОЛОГИИ СЕНСОНЕВРАЛЬНАЯ ТУГОУХОСТЬ**

Ташкент 2025

»УТВЕРЖДАЮ»
Директор Республиканского
Специализированного
научно-практического
центра Оториноларингологии и
заболеваний головы-шеи
У.С.Хасанов.



« » 2025_ год

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ СЕНСОНЕВРАЛЬНАЯ ТУГОУХОСТЬ

ТАШКЕНТ 2025

Примечание: Сенсоневральная тугоухость в неосложненных случаях контролируется и лечится в амбулаторных условиях.

Специалист дополнительный консультация	1. Жалобы и сбор анамнеза.	+	+	+	+	+	1 раз	
	2. Объективный осмотр	+	+	+	+	+	1 раз	
	3. Физикальное и клиническое обследование	+	+	+	+	+	1 раз	

Примечание: (по показаниям) в случае наличия у пациента дополнительных других или сопутствующих заболеваний по показаниям ему необходимо пройти обследование у других соответствующих специалистов узкого профиля, перечисленных в Национальном клиническом протоколе. Примечание: при выявлении у пациента другого дополнительного или сопутствующего заболевания необходимо обследование специалистами соответствующей узкой области согласно рекомендациям, предусмотренным Национальными клиническими протоколами; - при диагностировании заболевания в осложненном состоянии и в случаях, когда показано оперативное лечение, организуют хирургическую консультацию и направляют больного в стационар для стационарного и/или оперативного лечения в зависимости от состояния.

Основной Лабораторные исследования	Основной:							
	Общий анализ крови	+	+	+	+	+	1-2	
	Общий анализ мочи	+	+	+	+	+	1-2	
		+	+	+	+	+	1	

Примечание:

При выявлении сопутствующей патологии во время консультации пациента проводятся доступные лабораторные исследования на уровне медицинского учреждения.

Дополнительные Лабораторные исследования	Биохимический анализ крови (при необходимости)	+	+	+	+	+	1	
	Коагулограмма (при необходимости)	+	+	+	+	+	1	
	Определение сахара крови (при необходимости)	+	+	+	+	+	1	

Примечание:

Основные Инструментальные исследования	Отоскопия или отомикроскопия	+	+	+	+	+	2	
---	------------------------------	---	---	---	---	---	---	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Примечание:Примечание: В случае выявления сопутствующего заболевания во время консультации пациента проводятся доступные инструментальные диагностические исследования на уровне медицинского учреждения.

Дополнительные Инструментальные исследования	Аудиометрия		+	+	+	+	Когда необходимо
	Импедансометрия				+	+	Когда необходимо
	Рентгенография носа придаточных пазух		+	+	+	+	Когда необходимо
	КСВП, ОАЭ					+	Когда необходимо

Примечание: (в соответствии с инструкцией) При выявлении сопутствующих заболеваний во время консультации пациента проводятся доступные инструментальные диагностические исследования на уровне медицинских учреждений. Вышеперечисленные методы исследования делаются при наличии соответствующей аппаратуры или в случае ее отсутствия необходимо направить в вышестоящие инстанции.

ПОКАЗАНИЯ К СТАЦИОНАРНОМУ ЛЕЧЕНИЮ:

- Отсутствие условий для лечения в амбулаторных условиях
 - Наличие сопутствующей патологии (сахарный диабет, артериальная гипертензия и т.д.)
 - Внезапная или острая потеря слуха
- Указания по срочной госпитализации:
1. Внезапная или острая потеря слуха;
 2. Риск развития осложнений.

(МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Лечебные мероприятия (основные)		Виды и степень скорой и экстренной медицинской помощи					Средняя суточная доза ЦМП	Курсовая доза Районная (городская) больница Название Лекарственных средств (международное непатентованное)
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь				
Название Лекарственных средств (международное непатентованное)	Дозировка и применение лекарственных средств	СВП/СП	ЦМП	Районная (городская) больница Название Лекарственных средств (международное непатентованное)	Вилюят даражасидаги тиббиёт муассасалари Дозировка и применение лекарственных средств	Республиканские медицинские учреждения		
Гормонотерапия в убывающей дозировке	В зависимости от выбранного			+	+	+	Индивидуально по показаниям	Индивидуально по показаниям

(ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО / ОПЕРАЦИЯ)

Лечебные мероприятия (оперативное лечение)	По уровню и виду экстренной медицинской помощи				
	Амбулаторное лечение		Стационарная помощь		
Название операции/вмешательства/лечения	ОШП/ОП	КТМП	Районная (городская) больница	Областные медицинские учреждения	Республиканские медицинские учреждения
1. Шунтирование барабанной перепонки		+	+	+	+
2. Кохлеарная имплантация					+
...					
Комментарий: Вид и объем оперативного вмешательства выбирается индивидуально в зависимости от вида патологии и объема поражения. При наличии осложнений по необходимости привлекаются смежные специалисты в зависимости от осложнения					

(ЛЕЧЕБНАЯ ПИТАНИЕ/ДИЕТА)

Режим питания	По уровню и виду плановой медицинской помощи				
	Амбулатор ёрдам		Стационарная помощь		
Диетическая таблица и ее продолжительность	СВП/СП	ЦМП	Районная (городская) больница	Областные медицинские учреждения	Республиканские медицинские учреждения
1. Обеденный стол №15.	+	+	+	+	+
Примечание:					

(ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ)

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТА	Наименование медицинских услуг	СВП/СП	ЦМП	Минимальное количество мероприятий	Длительность диспансерного наблюдения
Консультация специалиста	Сурдолог	+	+	1-2 раза год	От 6 месяцев
	Невролог	+	+	1-2 раза год	От 6 месяцев
Примечание: Основными курирующими врачами являются семейный врач, сурдолог, оториноларинголог.					

Лабораторные исследования	Уровень Глюкозы крови	+	+	1-2 раза год	От 6 месяцев
	Коагулограмма	+	+	1-2 раза год	От 6 месяцев
Примечание:					
Инструментальные исследования	Тональная пороговая аудиометрия			1-2 раза в год	От 6 месяцев
Примечание: При острой сенсонеральной тугоухости при восстановлении слуха пациент наблюдается до 6 месяцев, при хроническом течении-наблюдение и периодическое лечение на протяжении всей жизни.					

(ПЕРВИЧНАЯ, ВТОРИЧНАЯ И ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА/СКРИНИНГ)

Профилактические меры	Название медицинских услуг		СВП/СП	ЦМП	Минимальное количество событий	Реабилитационный период
Комментарий:						
Первичная профилактика	Вести здоровый образ жизни, оказывать умеренные физические нагрузки на организм; Профилактика острых респираторных вирусных, бактериальных заболеваний ; Избегать приема ототоксических препаратов лекарств, отрицательно влияющих на работу вестибулярного аппарата и слух. Защищать уши во время работы в условиях повышенных шумов и вибраций, используя специальные наушники или беруши. Защищать уши во время плавания в бассейне и природных водоемах берушами или шапочкой. Заниматься профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний Заниматься профилактикой заболеваний шейного отдела позвоночника. Избегать сильных стрессов и переутомлений		+	+	постоянный	постоянный
Вторичная профилактика	Своевременное лечение кори, скарлатины, респираторных вирусных инфекций; санация верхних дыхательных путей. Избегать прослушивания громкой	+	+	+	По мере необходимости	По мере необходимости

	музыки в наушниках и в автомобиле или длительного пребывания возле колонок на концертах и мероприятиях.					
Третичная профилактика	См. Диспансеризацию					
Примечание:						